க்ரிலாக்ஸில்™ கோல்ட்

மெடாலாக்ஸில் + மன்கோஸெப் 72% டபிள்யு பி

(முறையான பூச்சிகொல்லி மருந்து)

க்ரிலாக்ஸில் கோல்ட் ஒரு பாதுகாப்புள்ள ஈரபதமுள்ள பூச்சிநாசினி பௌடர். இது லில்லிடேமிக் ஃபங்கிஸைட் மெடாலாக்ஸில் மற்றும் காண்டாக்ட் ஃபங்கிஸைட் மன்கோஸெப் இரண்டும் கலந்த கலவை. இதில் உள்ளது 80 க்ராம்/கிலோ மெடலாக்ஸில் (8% எம்/எம்) மேலும் 640 க்ராம்/கிலோ மன்கோஸெப் (64%எம்/எம்). 64.0% மெடலாக்ஸில்+மன்கோஸெப் சிறப்பாக வளருரும் பருவத்தில், செடிகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. உள்ளிருந்து முறையான ஊட்டம் மெடலாக்ஸில் அளிக்கிறது. மேலும் மன்கோஸெப் வெளியிலிருந்து தொடரிபினால் ஊட்டம் கொடுக்கிறது.

ரசாயன கலவை :

மெட்டாலாக்சில், ஏ.ஐ.	8.0% m/m
மான்கோசேப், ஏ.ஐ.	64.0% m/m
ஃபார்மால்டிஹைட் மற்றும் நாப்தலீன் பீனால் ஆகியவற்றின் ஒடுக்கம்	1.4% m/m
சல்போனிக் அமிலம் சோடியம் லாக்ட் அல்லது அதற்கு சமமானது (டிஸ்பெர்சிங் ஏஜண்ட்)	
லிஸரில் - பென்சிமிடாசோல் டிஸல்போனிக் அமிலம், சோடியம்	0.6% m/m
லாக்ட் அல்லது அதற்கு சமமான (வெட்டிங் ஏஜண்ட்)	
சிலிகிக் அமிலம் (கேரியர்)	0.6% m/m
கயோலின்	QS%
மொத்தம் :	100.0% m/m

பிரயோகம் : கீழ்கண்டவியாதிகளைகட்டுப்படுத்த க்ரிலாக்ஸில் கோல்ட் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது :

பயிர்	வியாதியின் பொதுவான பெயர்	ஒரு ஹேக்டேருக்கு பரிந்துரைக்கப்படும் அளவு			கடைசி துவக்குகிற்கு முன்னாடி வரை காத்திருக்கும் காலம்
		ஏஜ கிராம் அல்லது % ஏஜ	கலவை (கிராம்)	தண்ணீரில் கலந்தக்கூல (லீட்டர்)	
திராக்ஷை	டௌனி மில்டியூ	0.4% அல்லது 2000	0.5% அல்லது 2500	500	குறைந்தது 7 வாரங்கள்

(வேண்டாத கிளைகளை நறுக்கித் திருத்தம் செய்து 15-20 நாட்கள் பின் பூச்சி வருவதை தடுப்பதற்காக ஃபோலியர் ஸ்ப்ரே செய்யவும். இந்த முறையை 10-14 நாட்கள் இடை வெளிக்குள் அல்லது வெப்பமான மற்றும் ஈரோஷ்ண நிலையின் காரணத்தினால் டௌனி மைல்ட் டியு வியாதி வருவதின் முன், அதிமாக 4 முறை ஃபோலியர் ஸ்ப்ரே செய்யவும். இதன் பின், மற்ற பூச்சி கொல்லி மருந்துக்கு தேவைக்கேற்ப மாற்றிக் கொள்ளவும்)

புகையிலை செடிகள் வளர்க்கும் இடம்	ஈரத்தை அதற்கும் (பைத்திரியும் அபானிடர் மாடும்)	0.072% அல்லது 3600	0.1% அல்லது 5000	5000	குறைந்தது 7 வாரங்கள்
	லீப் பிளைட் பளாக் ஃவாங்க் (பைரோப்- தோராபாராஸிடிகா எப் நிகோடியனே)	0.14% அல்லது 1440	0.2% அல்லது 2000	1000	குறைந்தது 7 வாரங்கள்

(விதைக்கும் தருணத்தில் மண்ணை ஈரம் செய்துக் கொள்ளவும். மேலும் 30 நாட்கள் பின் ஸ்ப்ரே செய்யவும்)

உபயோகிக்கும் முறை : தேவைக்கேற்ப பூச்சிகொல்லியை அளந்து எடுத்துக்கொள்ளவும் மற்றும் அதில் சிறிது அளவு தண்ணீரை கலந்துக்கொள்ளவும். பின் நீரி இருக்கும் குறிப்பிட்ட அளவு தண்ணீரை எடுத்து தக்கவும். நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர்கள், கை கம்ப்ரேஷன் ஸ்ப்ரேயர்கள்போன்ற அதிக வால்யூம் ஸ்ப்ரேயர்களை உபயோகிக்கும் போது ஹேக்டேரின் அளவுக்கு தகுந்தபடி பூச்சி கொல்லியின் அளவுக்கு தேவைப்படும் தண்ணீரை கலந்துக்கொள்ளவும். மோட்டோரைஸ்ட் நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர்கள், மிஸட் ப்லோயர்கள் போன்ற குறைந்த வால்யூம் ஸ்ப்ரேயர்களிலும் பிரயோகப்படும்.

ஏற்றதாயிருத்தல் (கம்பாடிபிலிடி) : பரிந்துரைக்கும் விகிதத்தில், லைம் ஸல்பரை தவிர, க்ளோராக்லில் கோல்ட் மற்ற எல்லா வித பொதுவான பூச்சி நாசினி மற்றும் தொந்தரவு கொடுக்கும் (எலி, கொக போன்ற) பிராணிகளை நாசம் செய்யும் மருந்துகளுடன் ஏற்றதாயிருக்கும்.

முன்னெச்சரிக்கை : ஸ்ப்ரே செய்ய கலைக்கும் பாத்திரங்களை உபயோகிக்க கூடாது. ஸ்ப்ரே கலவையை கலக்க, கம்பை உபயோகிக்கவும். சமுக்குடன் தொடர்ப்பு இல்லாம விநியோகத்துக்கு கை கவ்லேய்வை உபயோகிக்கவும். மூக்க இழுப்பதை தவிர்க்கவும் மற்றும் கலவை கண்களில் படுவதை தவிர்க்கவும். பாதுகாப்பு அளிக்கிர்கான உடைகளையே அணிந்துக்கொள்ள வேண்டும். ஸ்ப்ரே செய்யும் போழுது முகமூடி, பொரிய மூக்குக்கண்ணாடி மற்றும் பூட்ஸை அணிந்துக் கொள்ள வேண்டும். நாஜூலிவை வாயிலாக ஊக்கக்கூடாது பூச்சிநாசினியை உபயோகிக்கும் போது, அல்லது பிரயோகிக்கும் போது ஒன்றும் சாப்பிடக்கூடாது ஒன்றும் குடிக்க கூடாது மற்றும் புகை பிடிக்கவும் கூடாது . உபயோகிக்க பட்ட ஸ்ப்ரே கலவையை கேபித்து கலக்க கூடாது. ஸ்ப்ரேயரில், பக்கெட்டுகள் மற்றும் மற்ற சாமான்களை தினமும் உபயோகித்த பின் நன்றாக அலம்பவும். விக்கலை கோப்பு போட்டு வித்தும் செய்யவும் மற்றும் நிலமாய தண்ணீரில் அலம்பவும். வேலை ஆனப்பிறகு, உடுக்கை மாற்றிக்கொள்ளவும். அசுத்தம் ஆக்கப்பட்ட உடைகளையும் தோய்க்கவும். நீர்த்தாவர, சிறுகளம் குடல்ட போன்ற நீர் மார்க்கங்களில் மீதியுள்ள ஸ்ப்ரே பொருட்களை கலப்பது, ஸ்ப்ரேயர்கள் கத்தம் செய்வது, அசுத்தமான பக்கெட்களை அலம்புவது இது போன்ற காரியங்களை தவிர்க்கவும். ஈ இருக்கும் பொழுது ஸ்ப்ரே செய்யக் கூடாது. பாதிதுவாக்கும் அளவில் பூச்சிநாசினியை உபயோகித்தால், காட்டு விலங்குகளும், பறவைகளும் சேர்த்து உயிரினங்கள் பாதிக்கப்படாது, விஷம் ஏறியதின் ஏதாவது அறிகுறிகள் இருந்தால், உடனே டாக்டரை அணுகவும்.

விஷங்களின் தன்மை : எலிகளுக்கு கடுமையான வாய் மூலம் கொடுக்கப்படும் எல் டி 50 அதன் உடல் நிடைக்கு 5000 மில்லி க்ராம் /கிலோவிற்கு மேளாக உள்ளது. இதனால் எலிகளுக்கு சுருமத்தில் மிதமாக எரிக்கல். இருக்கும். இதனால் முயல்களுக்கு கண்ணில் கொஞ்சம் எரிக்கல் இருக்கும்.

விஷம் ஏறுவதின் அறிகுறி மற்றும் அதன் சிகிச்சை : எலிகளில், வீங்குனா ஆராய்ச்சி மைய குழுவில், கீழே சொல்லப்பட்ட விஷம் ஏறுவதின்அறிகுறிகள் காணப்பட்டன. மயக்கத்தில் இருப்பது, மூக்க (முட்டுதல், குறுகி உட்காறுதல், மேலும் விண்றப்பான தோல். விஷம் ஏறினிட்டால், உடனே டாக்டரை அணுகவும். ஒரு வேளை, விஷம் வாய் மூலம் ஏறி இருந்தால், அந்த நபரை வாந்தி எடுக்க வைக்கவேண்டும். ஒரு வேளை, விஷம் வெளியுறுத்தலிருந்து ஏறி இருந்தால், சோப்பை போட்டு அலம்பி விடவும், மேலும் அசுத்தம் செய்யப்பட்ட உடைகளை களைந்து, அந்த நபரை சுத்தமான காற்றோட்டமான இடத்தில் வைக்கவும்.

விஷமுறிவு மருந்து : இந்த பூச்சிநாசினிக்கு விஷமுறிவு மருந்து ஒன்றும் இல்லை. ஆகவே அறிகுறிக்கு ஏற்ற மருந்துவ உதவியை நாடவும்.

உபயோகப்படுத்தும் பாத்திரங்களை அப்புறப்படுத்துவது : 1. சுற்றுப்புறத்தில் தண்ணீர் அசுத்தம் ஆகாமல் இருக்க, பூச்சிநாசினியின் பொட்டலங்கள் அல்லது மீதியிருக்கும் கலவை மற்றும் இழுந்திருக்கத்த அம்பிபி வீட்ட தண்ணீர் இல்லாதை ஜூக்கிரதையாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும். 2.உபயோகித்த பூச்சிநாசினியின் பொட்டலங்களை வெளியேவீட்டு வைக்க கூடாது. இதைத் மறுபடியும் உபயோகிப்பதைத் தவிர்க்கவும். 3. பொட்டலங்களை உபயோகித்து வெகுநாற்கில் புதைக்க வேண்டும்.

பண்டகசாலை : 1. பூச்சி கொல்லிகளைஎப்பொட்டலங்களை தனி அறையில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த அறை சாப்பிடும் பொருட்கள் கலக்கப்பட்டு இருக்கும் இடத்திலிருந்து இருக்க வேண்டும். பூச்சிகொல்லியின் அளவு மற்றும் இயல்பை பொறுத்து இதை தனியான அலமாரியில் பூட்டு சாவியுடன் வைக்க வேண்டும். 2.பூச்சிகொல்லி வைக்கப்பட்ட அறைகள், இடங்கள் நன்றாக கட்டப்பட்டு, உலர்த்ததாகவும், நல்ல வெளி சுத்தமுடன் மேலும் நல்ல காற்றோட்ட வசதியுடன் மற்றும் நோயிலுக்கு அசுத்தமாகாமல் தவிர்க்க தகுந்த இடை வெளியுடன் இருக்க வேண்டும்.

எச்சரிக்கை : அனுபவத்தினால் உணர்ந்தது என்னவென்றால், டொடாலாக்லிலுக்கு இயற்கையாகவே காளான்களை எதிர்த்து நிற்கும் மாற்றம் வாலாம். இது பூச்சிநாசினியின் திறமையை குறைத்து விடும். இந்த எதிர்ப்பு வருவதை நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. க்ளோராக்லில் கோல்ட் எதிர்ப்பு தன்மையை கட்டுப்படுத்த முடியாத தோல்விக்கு நாங்கள் எந்த விதமான பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.

லயபிலிடி க்ளாஸ் : உற்பத்தியாளரின் வல்லமையை அறிந்து. இந்த பூச்சிநாசினியை உபயோகிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. சூழ்நிலை மண்ணின் நிலை, செடியின் வகை, எதிர்ப்பு அளிக்கும் தன்மை. ஸ்ப்ரே செய்யும் விதம் இது போன்ற பல காரணத்தினால் பூச்சிநாசினியின் தன்மை பாதிக்கப்படுகிறது.

இந்த பூச்சிநாசினியின் உபயோகம் நம் கட்டுப்பாட்டை விட பல மடங்கு அதிமாக இருப்பதால், நாம் இப் பொருளின் சீரான தரம் தவிர வேறு எந்த விதமான பொறுப்பையும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது.

சீல் செய்த ஒரிஜினல் பாக்கிங்கில் வாங்கி இருந்தால் மட்டுமே, உற்பத்தியாளர் இப் பொருளுக்கு உத்திரவாதம் தருவார்கள்.

பிரத்யேக மறு நுழைவு காலம்: 24 மணி நேரம்.

எச்சரிக்கை: லீஃப்லெட்டில் கூறியது தவிர வேறு எந்த பயிரிலும் பிரயோகம் செய்வது கூடாது.

Tamil

ಕ್ರೈಲೆಕ್ಸಿಲ್™ ಗೋಲ್ಡ್

ಮೆಟಾಲಕ್ಸಿಲ್ + ಮೆಂಕೋಜೆಬ್ 72 ಡಬ್ಲ್ಯು ಪಿ

(ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಬೂಜುಹುಳ ನಾಶಕ)

ಕ್ರೈಲೆಕ್ಸಿಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಬಹುದಾದ ಸಕ್ಕಯ ಪುಡಿ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಗೆ ಹುಳ ನಾಶಕ ಮೆಟಾಲಕ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಹುಳ ನಾಶಕ ಮೆಂಕೋಜೆಬ್ ಎಂಬುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 80 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಮೆಟಾಲಕ್ಸಿಲ್ (8% ಎಮ್/ಎಮ್) ಮತ್ತು 640 ಗ್ರಾಮ್/ಕೆಜಿ ಮೆಂಕೋಜೆಬ್ (64% ಎಮ್/ಎಮ್) ಉಂಟು ಮೆಟಾಲಕ್ಸಿಲ್ + ಮೆಂಕೋಜೆಬ್ ಲಕ್ಷ ವೃಳ್ಳ ಸಸಗಳನ್ನು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳಿಂದ ಎರಡುವಿಧವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವುದು ಒಳಗಿನದ ಮೆಟಾಲಕ್ಸಿಲ್ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆಂಕೋಜೆಬ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇಡುವುದು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್, ಆ.ಐ.	8.0% m/m
ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್, ಎ.ಐ.	64.0% m/m
ಫಾರ್ಮಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಪ್ಥಲೀನ್ ಫೀನಾಲ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಮಾನ (ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್)	1.4% m/m
ಸ್ಟಿರಿಲ್ – ಬೆಂಜಿಮಿಡಾಜೋಲ್ ಡೈಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಮಾನ (ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್)	0.6% m/m
ಸಿಲಿಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ (ವಾಹಕ)	0.6% m/m
ಕಾಯೋಲಿನ್	QS%
ಒಟ್ಟು :	100.00% w/w

ಉಪಯೋಗ : ಈ ಕೆಳಂದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಶತಮಯ ಕ್ರೈಲೆಕ್ಸಿಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನುಮೋದಿತ.

ಫಸಲ	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ			ಕೊನೆಯ ಚುಮಿಕಿ ಸುವ ಸಮಯದಿಂದ ಫಸಲು ಕೊಯಿಲು ಬರುವ ವರೆಗು
		ಎಐ ಗ್ರಾಮ್/ % ಎಐ	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ ಗ್ರಾ	ನೀರಿನ ಮತ್ತ ಲೀಟರ್	
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಮಂಬುಹುಳ	0.4% ಅಥವಾ 2000	0.5% ಅಥವಾ 2500	500	ಕಡೆಯಪಕ್ಷ 7 ವಾರಗಳು

10–20 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹುಳುಹುಗಳು ಬರದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಿಮಿಧಿ ಯನ್ನು ಚುಮಿಕಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ 10–14 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಡೆವರೆಗು ನಾಲುಕು ಬಾರಿ ಚುಮಿಕಿಸುವುದು ಬಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಲಿಗಾಲದ ಹವಾಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲಿಗೆ ಮಂಬುಹುಳ ಬರುವ ಸಂಭವವಿದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಪರವರ್ತಿಸಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳೆಬ್ಬಾದ ಹುಳನಾಶಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಸಸಿ	ಕ್ಯಾವ (ಪೈಥಿಯಂ ಅಫಾನಿಡರ್ ಮೇಟಮ್)	0.072% ಅಥವಾ 3600	0.1% ಅಥವಾ 5000	5000	ಕಡೆಯಪಕ್ಷ 7 ವಾರಗಳು
	ನೀರಿನಿಂದ ಕಪ್ಪಗೆ	0.14% ಅಥವಾ 1440	0.2% ಅಥವಾ 2000	1000	ಕಡೆಯಪಕ್ಷ 7 ವಾರಗಳು
	ಆಗುವುದು (ಪೈಟೊಪ್ಥೋರ ಪಾರಾಸಿಟಿಕಾ ಎಫ್ ನಿಕೊಟಿಯನೆ)	ಅಥವಾ 1440	ಅಥವಾ 2000		

(ನಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಭೂಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಟ್ಟು 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಔಷಧಿ ಚುಮಿಕಿಸುವುದು)

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಅವಶ್ಯಕದಷ್ಟು ಹೊಸಮಡಿ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆ. ಅಮೇಲೆ ಏಕ್ಕಿದ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲುಪೆಕು. ಈ ಮಿಶ್ರಿಯಾ ಒಂದು ಪೆಕ್ಕರಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಮಾಣದ ಚಮುಕಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಅದು ದ್ವೈನ ಮೇಲೆ ಹೊಯದ, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಒತ್ತಡ ದಿಂದ ಚಮುಕಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೇಲಂಟ್ ಹಾಲಿನ ಚಮುಕಿಸುವ ಯಂತ್ರ, ತುಂತುರು ಪಿಚಕಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗೆಲೊಗೃ ಬಳಕೆ.

ಮಿಶ್ರಣಗಳು : ಅಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಲೆಕ್ಸಿಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿಶ್ರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಮತ್ತು ಬೂಜು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಆದರೆ ಗಂಧಕ (ಲೈಮ್ ಸಲ್ಫರ್) ಮಿಶ್ರಿಗೆಲಂ ಬಾರದು.

ಸಾವಧಾನ : ಔಷಧಿ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಮತ್ತುಕೀಲಿನಿಂದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಲುಪುವುದು. ಚರ್ಮದನ್ನು ರಕ್ಷಿ. ಕೊಳ್ಳಲು ಕೈತೊಡಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಉಡುಗೆ, ಮುಖವಾಡ, ಕನ್ನಡಕ, ಬೂಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶಿಂರದ ಮೇಲೆ ಬಳಗದ ಹಾಗೆ ಚುಮುಕಿಸುವುದು.

ಕೈಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಉಜದಾರದು. ಚುಮುಕಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು, ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇದ. ಉಳಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಉಪಯೋಗಿಸದಮೇಲೆ ಚುಮುಕಿಸುವ ಯಂತ್ರ, ಬಕೆಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಶುದ್ಧ ಪಡಿಸುವುದು. ಕೆಲವರುಂತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೋಪುಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು. ದೂಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು. ಉಳಿದ ಮಿಶ್ರಣ, ಚುಮುಕಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು, ಕುಡಿತ ಬಕೆಟ್ಟುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಪಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಲುಷಿತಮಾಡಬಾರದು. ಕೆಸರು ಹುಳಗಳು ಹಾಗಾಡುವಾಗ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚಮುಕಿಸುವುದು ನಿಷಿದ, ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾತ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಮೃಗಜಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಗರುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಅದರೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಮೈದ್ರಗ ಸಂಬಂಧವುದು ಉಂಟಿತ.

ವಿಷಯತ್ವ : ಇಲಿಗಾಗಿ ಒರಲ್ LD 50 ಇರಿಯಯಿಂದ ಭಾರಕ್ಕೆಂದ 5000 ಎಮ್ /ಕೆಜಿ ಮೆಟ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಲಗಳ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಿತಮಾದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಗಾಯುವುದು.

ವಿಷಲೇಪ್ಪದ ಲಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ರೆಕಾಯನ ಶಾಲೆಯ ಅನುಸಾರ ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈಕೆಳ ಕಂಡ ವಿಷಲೇಪ್ಪದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಲೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ, ಆಕಯಿಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಉಳರು ಅಡಲು ಕಷ್ಟ, ಕಂಪನ, ಚರ್ಮದ ಸುರಿಯುವುದು. ವಿಷವೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷಯುಕ್ತವಾದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸುವುದು. ಬಹುಶ ಕಲುಶಿತ ಕಣ್ಣುಗಳು ಶುಂರದ ಮೇಲೆ ಅದರೆ ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿ ರೋಗಿಯ ಕಲುಶಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಚಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾಶಾವಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು.

ವಿಷಹಾರಕ : ಯಾವ ವಿಧವಾದ ವಿಷನಾಶಕ ಅಥವಾ ವಿಷಲೇಪ್ಪದ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ವಿಧಿಯಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತ.

ಮಾರಿ ಚಟ್ಟುಗಳ್ಳದ ಗಳು : ಮಾರಿ ಚಟ್ಟುಗಳು ಅಥವಾ ಉಳದ ಮಿಶ್ರಣ, ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳು ಕೊಳದ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ್ಥಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತ ವಾಗದಂತೆ ನಶಪಡಿಸುವುದು. 2. ಮಾರಿಯಾದ ಚಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದಂತೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಕ ಬೇಕು. 3. ಮಾರಿ ಚಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಧಿಧ್ರವಾಗಿ ಉಗುರಿಸಿದ ದೂರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂತಿಡಬೇಕು.

ಭದ್ರತೆಯನ್ನುವುದು : 1. ಬೂಜೂ ಮಳೆಗಾಳಿ ಚಟ್ಟಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೊಠಡಿ ಅಥವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ಷವಾಗಿ ಕಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದೂರ ವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾಸುರಿಯಿದ್ದಿ ಬಳಗಾಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದು ಸುಳಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು. 2. ಬೂಜೂ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವತ್ಯವಾದ, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು, ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಯಂದ ಕೆಡದ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು.

ಸಾವಧಾನ : ಅಂಕಿಅಂಶದಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಬೂಜೂ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಕೀಟನಾಶಕದಿಂದ ಪ್ರತಿಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಷ್ಪಲಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಫಸಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು. ಏ ಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲೆ ಕಂಡು ಬರುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವಿಧಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲಿರುವೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ರೈಲೆಕ್ಸಿಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಫಸಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಣೆರು.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ : ಈ ಮಿಶ್ರಿಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಯೋಗದ ಅಧಾರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಹದ, ಸತ್ವದ ವಿಧ, ಪ್ರತಿಕಾರ ಶಕ್ತಿ , ಹುಮಿಕಾಯ ವಿಧದ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಈ ಮಿಶ್ರಿಯದುಮೇಲೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು. ಇದರ ಉಪಯೋಗ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ, ನಾವು ಗುಣಾಂಕ್ಕದಾದ ಕೀಟನಾಶಕ ವನ್ನು ಕೊಡುವುದೆ ವಿನಹ ಮತ್ತೆ ಯೊವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯರು.

ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಮಿಶ್ರಿ ಯಿಂದ ಮಾತ್ರದೆ ನಿರ್ಮಾತರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ: 24 ಗಂಟೆಗಳು

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ ಮೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.

Kannada

ক্ৰিল্যাক্সিল™ গোল্ড

মেটাল্যাক্সিল + ম্যান্‌কোজেব ৭২% ডব্লিউ.পি.

(সংবাহী ছত্ৰাকনাশক)

ক্ৰিল্যাক্সিল গোল্ড এক ছত্ৰাক প্ৰতিৰোধকাৰী জলে দ্ৰবণশীল পাউডাৰ যাহা দুই প্ৰকাৰ ছত্ৰাকনাশক – অন্তৰ্বাহী মেটাল্যাক্সিল ও স্পৰ্শজনিত ছত্ৰাকনাশক ম্যানকোজেবৰ মিশণ। এই মিশ্ৰ ছত্ৰাকনাশকে ৮০ গ্ৰাম/কেজি মেটাল্যাক্সিল (৮% এম/এম) এবং ৬৪০ গ্ৰাম/কেজি ম্যান্‌কোজেব (৬৪% এম/এম) আছে। মেটাল্যাক্সিল ও ম্যান্‌কোজেবৰে মিশণ দুইয়ে বেগৰ ফলকে ৰক্ষা কৰে। প্ৰথম মেটাল্যাক্সিলে অন্তৰ্বাহী ক্ৰিয়াৰ মাধ্যমে ও দ্বিতীয় ম্যান্‌কোজেবৰে স্পৰ্শজনিত ক্ৰিয়াৰ সাহায্যে ফসল সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা পায়।

ৰাসায়নিক উপাদান:

মেটালাক্সিল, সক্রিয় উপাদান	৮.০% মি/মি
মানকোজেব,সক্রিয় উপাদান	৬৪.০% মি/মি
ফর্মালডিহাইড এবং ন্যাপথলিন ফেনল সালফোনিক অ্যাসিড সোডিয়াম লবণ ব

କ୍ରିଲେକ୍ସିଲ™ ଗୋଲ୍ଡ

ମେଟାଲେକ୍ସିଲ୍ + ମେନ୍‌କୋଜେବ୍ ୭୨% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପି

(ସିଷ୍ଟେମିକ୍ ଫାଙ୍ଗିସାଇଡ୍)

କ୍ରିଲେକ୍ସିଲ ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଟିଏ ନିରାପରାଜାରୀ ଭିଜା ଯାଇ ପାଉଡ଼ାର ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ପାଉଡର, ଯାହାକି ସିଷ୍ଟେମିକ ଫାଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ମେଟାଲେକ୍ସିଲ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫାଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ମେନ୍‌କୋଜେବ୍‌ର ଏକ ମିଶ୍ରଣ । ଏଥିରେ ଅଛି ୮୦ ଗ୍ରାମ/କିଗ୍ରା ମେଟାଲେକ୍ସିଲ୍ (୮% ଏମ୍/ଏମ୍) ଏବଂ ୬୪୦ ଗ୍ରାମ/କିଗ୍ରା ମେନ୍‌କୋଜେବ୍ (୬୪% ଏମ୍/ଏମ୍)। ମେଟାଲେକ୍ସିଲ୍ + ମେନ୍‌କୋଜେବ୍ ଗଛର ସକ୍ରିୟ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଭିତରୁ ମେଟାଲେକ୍ସିଲ୍‌ର ସିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ସକ୍ରିୟତା ଏବଂ ବାହାରୁ ମେନ୍‌କୋଜେବର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସକ୍ରିୟତା ଗଛର ଦ୍ୱିଗୁଣ ନିରାପରାର ନିଶ୍ଚୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ରାସାୟନିକ ରଚନା :-

ମେଟାଲାକ୍ସିଲ, ଅ.ଷି.	୮.୦% ମି/ମି
ମାନକୋଜେବ, ଅ.ଷି.	୬୪.୦% ମି/ମି
ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ ଏବଂ ନାପଥଲିନ ଫେନୋଲ ସଲଫୋନିକ ଏସିଡ ସୋଡିୟମ ଲବଣ କିମ୍ବା ସମତୁଲ୍ୟ (ଡିସପର୍ସିଙ୍ଗ ଏଜେଣ୍ଟ)	୧.୪% ମି/ମି
ଷ୍ଟିରିଲ – ବେଞ୍ଜିମିଡାଜୋଲ ଡାଇସଲଫୋନିକ ଏସିଡ, ସୋଡିୟମ ଲୁଣ କିମ୍ବା ସମାନ (ୱେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ)	୦.୬% ମି/ମି
ସିଲିକିକ ଏସିଡ (ବାହକ)	୦.୬% ମି/ମି
କାଓଲିନ	ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ମି/ମି
	ମୋଟ : ୧୦୦.୦୦% ମି/ମି

ପ୍ରୟୋଗ : ନିମ୍ନଲିଖିତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାପାଇଁ କ୍ରିଲେକ୍ସିଲ ଗୋଲ୍ଡ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ।

ଫସଲ	ରୋଗର ସାଧାରଣ ନାମ	ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ମାତ୍ରା			ଶେଷ ସ୍ପ୍ରେଠାରୁ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାର ସମୟ
		ଏ.ଆଇ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା % ଏ.ଆଇ	ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ (ଗ୍ରା)	ପାଣିରେ ପତଳା କରିବା (ଲି)	
ଅଙ୍ଗୁର	ପତ୍ରରେ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ	୦.୪% କିମ୍ବା ୨୦୦୦	୦.୫% କିମ୍ବା ୨୫୦୦	୫୦୦	୭ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ନୁହେଁ
	(ଗଛାଗଛର ଅମାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ କାଟିବାର ୧୫-୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗପ୍ରତିରୋଧକ ପଯୋଗ କ୍ସ୍ରେ କରାଯାଇ ଏବଂ ୧୦-୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ କିମ୍ବା ଫସଲକୁ ପତ୍ରରେ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରବଣତା ଲାର୍ଯ୍ୟବାରା ବେଗମାନ୍ତ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୪ଥର କ୍ସ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗକୁ ବୋହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାରରେ ଏକ ବୈକଳ୍ପିକ ନିରାପରାଜାରୀ ଫାଙ୍ଗିସାଇଡ୍‌କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ)				
ତମାଖୁ ନର୍ସରୀ	ଝରାଢରା (ପିଥିୟମ ଅଫେନାଡାର୍ମେଟମ୍)	୦.୦୭୨% କିମ୍ବା ୩୬୦୦	୦.୧% କିମ୍ବା ୫୦୦୦	୫୦୦୦	୭ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ନୁହେଁ
	ପତ୍ରମୋଡ଼ା/କଳା ଜିଙ୍କୋଡ୍ (ଫାଇଟୋପୋଥୋରା ପାରାସାଇଟିକା ଏଫ୍ ନିକୋଟିଆନା)	୦.୧୪% କିମ୍ବା ୧୪୪୦	୦.୨% କିମ୍ବା ୨୦୦୦	୧୦୦୦	୭ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ନୁହେଁ
	(ରୁଣିଆ ସମୟରେ ମାଟି ଓଦାଥିବ ଏବଂ ରୁଣିବାର ୩୦ ଦିନ ପରେ କ୍ସ୍ରେ କରିବେ)				

ବ୍ୟବହାର ବିଧି : ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ମାପି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପାଣି ସହିତ ମିଶାନ୍ତୁ । ଭଲଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବାପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଢାଳନ୍ତୁ, ନେପ୍‌ସେକ୍ସ ସ୍ପ୍ରେୟାର ହ୍ୱାଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେସନ ସ୍ପ୍ରେୟାର ଭଳି ଅଧିକ ଧାରଣକ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ପ୍ରେୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଏକ ହେକ୍ଟର ଜମି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣି ଅନୁପାତରେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ପରିମାଣକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ । ମଟରାଇଜଡ୍ ନେପ୍‌ସେକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟାରସ୍, ମିଷ୍ଟ ବ୍ଲୋଆରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ଉପଯୋଗିତା : କ୍ରିଲେକ୍ସିଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଲାଇମ୍ ସାଲଫାର ଛଡ଼ା ସାଧାରଣତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଫାଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାପ୍ ଖୁଆଇବା ଭଳି ।

ସାବଧାନତା : କ୍ସ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କ୍ସ୍ରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ଘାଣ୍ଟିବାପାଇଁ ଲାଠିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଚମଡ଼ାରେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ । ଧୂଳିକୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଖିରେ ଯେପରି ନ ଲାଗେ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରଖନ୍ତୁ । କ୍ସ୍ରେ କରିବା ସମୟରେ ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୁଗାପଟା, ଦୁଖା, ବୁଟମୋଜା ଓ ଗ୍ଲୋବ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ସ୍ରେ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିଜଲୁଗୁ ଧୂଳିକୁ ଫୁଙ୍କୁନ୍ତୁ ନାହିଁ । କ୍ରିଲେକ୍ସିଲ ଗୋଲ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଧୂମ୍ରପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅବ୍ୟବହୃତ କ୍ସ୍ରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର ପରେ ପାଣିଦ୍ୱାରା ସ୍ପ୍ରେୟାର, ବାଲଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ସଫା କରି ରଖନ୍ତୁ । କାମ ସରିବା ପରେ ସାବୁନ ଓ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇ ହାତ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୁଗା ବଦଳାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ବଳକା ମିଶ୍ରଣ, କ୍ସ୍ରେ ସରଞ୍ଜାମରେ ରହିଯାଇଥିବା ମିଶ୍ରଣକୁ ଝରଣା, ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ପ୍ରଭୃତିରେ ଢାଳି କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରେୟାର ଓ ଦୂଷିତ ବାଲଟିକୁ ଧୋଇବା ସେଥିରୁ ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମଜୁମାଛିମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସମୟରେ କ୍ସ୍ରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ହୁଏନି । କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷକ୍ରିୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁରନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।

ବିଷାକ୍ତତା : ଏକ୍ସୁଟ୍ ଓରାଲ ଏଲ୍‌ଡି ୫୦ ମୂଷା ପାଇଁ ୫୦୦୦ ମିଲିଗ୍ରାମ/କିଗ୍ରା ବଡି ୱେଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକା ଏହା ଠେକୁଆର ତମାଖୁପ୍ରତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପ୍ରଦାହଜନକ ଏବଂ ଆଖିକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଦାହଜନକ ।

ବିଷକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା : ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିମ୍ନରେ ବିଆଯାଇଥିବା ବିଷ-କ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେଡେସନ୍, ଡିସପ୍ନୋଇଆ, ଏକ୍ସଫଥାଲମାସ, ବାଙ୍କ ପୋଷ୍ଚାର ଏବଂ ରାଫ୍‌ଲ୍ ଫାଲ । ବିଷକ୍ରିୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍‌କ୍ଷଣାତ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ । ପାଟିଦ୍ୱାରା ଖାଇବା ଫଳରେ ବିଷକ୍ରିୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାନ୍ତି କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବାହ୍ୟିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଂଶକୁ ସାବୁନ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୂଷିତ ଲୁଗାପଟାକୁ ବାହାର କରି ଦେଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧୋଇବା ପରବରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ : କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷେଧକ ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ । ଲକ୍ଷଣାନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ।

ଆଧାରପାତ୍ରର ନିଷ୍କାରଣ : ୧.ପ୍ୟାକେଜ୍ କିମ୍ବା କଳକା ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କମେଡ଼ିନ୍ ଓ ଆଧାର ପାତ୍ରର ଧୁଆ ପଦାର୍ଥ ଏମିତି ଏକ ନିରାପଦ ପଦ୍ଧତିରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ଉଚିତ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜଳାଶୟ ଦୂଷଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରା ଯାଇପାରେ । ୨. ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ ଦ୍ୱିତୀୟଥର ବ୍ୟବହାରରୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାପାଇଁ ବାହାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ୩.ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଲୋକାଳୟ ବାହାରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟୋରେଜ : ୧.ଫାଙ୍ଗିସାଇଡ୍‌ର ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ ଏକ ଅଲଗା ଘରେ ରଖାଯିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମୁଖ୍ୟତ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଫାଙ୍ଗିସାଇଡ୍‌ରେ ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅଲଗା ଆଲମାରିରେ ତାଲା ଦେଇ ରଖିବେ । ୨. ଫାଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ ସ୍ଥାନଟି କିମ୍ବା ଘରଟି ଶୁଖିଲା, ଆଲୋକିତ, ବାୟୁସଞ୍ଚାଳିତ ଏବଂ ବାୟୁରୁ ଦୂଷିତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଗାରେ ନିର୍ମିତ ହେବା ଉଚିତ ।

ସତର୍କତା : ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ମେଟାଲେକ୍ସିଲ୍‌ର ପ୍ରତି ଫଙ୍ଗସ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଫଳରେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଗୁଣରେ ହ୍ରାସ ଘଟିପାରେ, ଯଦିବି ପ୍ରତିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବାଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନରେ କ୍ଷତି ସମ୍ଭବରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି । କ୍ରିଲେକ୍ସିଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅପରାଗରୀ ଯୋଗୁଁ ଫସଲର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ହେତୁହୋଇ ନାହିଁ ।

ଦାୟିତ୍ୱ : ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧୁନିକ ସ୍ତରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରଡକ୍ଟଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ପାଣିପାଗ, ମାଟିର ଅବସ୍ଥା, ଗଛର ଶ୍ରେଣୀ, ପ୍ରତିରୋଧ, ସ୍ପ୍ରେଙ୍ଗ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଡକ୍ଟର ଗୁଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବାହାରେ । ପ୍ରଡକ୍ଟର ଗୁଣିତି ଛଡ଼ା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ । ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଡକ୍ଟର ଗୁଣିତି ସମ୍ଭବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରକୃତ ସିଲ୍ ପ୍ୟାକିଂ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ।

ଜାତପତଙ୍ଗ ନାଶକ ବ୍ୟବହାର ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଖେତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।

ଚେତାବନୀ : ଲେବଲ୍ / ଲିଫ୍‌ଲେଟ୍ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଏବଂ ଜୀବ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

Oriya

क्रिलाक्सील™ गोल्ड

मेटालेक्सिल + मेन्कोजेब ७२% डब्ल्यु पी

(अंतवाही फफुंदीनाशक)

क्रिलाक्सील गोल्ड एक अत्यंत सक्रिय धुलनशील पाउडर फफुंदीनाशक है, जो कि सिस्टेमिक फफुंदीनाशक मेटालेक्सिल तथा दैहिक फफुंदीनाशक मेन्कोजेब का मिश्रण है। इसमें ८० ग्रा०/किलो मेटालेक्सिल (८% एम/एम) तथा ६४० ग्रा०/किलो मेन्कोजेब (६४% एम एम) होता है। मेटालेक्सिल+मेन्कोजेब फेंगों के बिमारी से दोहरा बचाव करता है, अन्दरची मेटालेक्सिल को अंतवाही क्रिया के द्वारा तथा बाहरी, मेन्कोजेब की स्पर्श या दैहिक क्रिया द्वारा।

रासायनिक संरचना :

मेटलैक्सिल, ए.आई.	८.०% मि/मि
मैंकोजेब, ए.आई.	६४.०% मि/मि
फॉर्मलडिहाइड और नेप्थलीन फिनोल का संघनन सल्फोनिक एसिड सोडियम साल्ट या समान डिस्पर्सि एजेंट	१.४% मि/मि
स्टीयरिल – बेंज़िमिडाज़ोल डिसल्फ़ोनिक एसिड, सोडियम साल्ट या समान (वेट्टिंग एजेंट)	०.६% मि/मि
सिलिकिक एसिड (वाहक)	०.६% मि/मि
केओलिन	पर्याप्त मात्रा
कुल :	**१००.०% मि/मि**

उपयोग : क्रिलाक्सील गोल्ड की सिफारिश निम्नलिखित बीमारीयों की रोकथाम के लिए की जाती है :

फसल	रोग का सामान्य नाम	प्रति हेक्टर मात्रा			आखिरी छिड़काव व कटाई के बीच अंतर (हफ्तों में)
		ग्रा० क्रियाशील तत्व या % क्रियाशील तत्व	संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	
अंगुर	मृदुरोमिल फफुंदी	०.४% या २०००	०.५% या २५००	५००	कम से कम ७ हफ्ते
	(पहला छिड़काव ३-४ पत्तो की अवस्था में, कटाई के १५-२० दिन पश्चात्, बीमारी शुरु होने के पहले ही करें। या जैसे ही गर्म और आर्द्र मौसम जो कि मृदुरोमिल फफुंदी के लिए अनुकूल है, शुन्य हो, छिड़काव करें। तीन से चार छिड़काव १०-१४ दिन के अन्तर पर, आखिरी छिड़काव के बाद किसी बचाव दायक फफुंदीनाशक के छिड़काव की तालिका से करें।)				
तम्बाकू पौधा	आर्द्रगलन	०.०७२% या ३६००	०.१% या ५०००	५०००	कम से कम ७ हफ्ते
	पानी अंगमारी	०.१४% या १४४०	०.२% या २०००	१०००	कम से कम ७ हफ्ते
	काला तना				
	(भूमि उपचार बोने के समय और छिड़काव बोने के ३० दिन पश्चात)				

उपयोग और पादप सुरक्षा यंत्र प्रयोग के लिए : जरूरी मात्रा को मापकर उसे थोड़े पानी में अच्छी प्रकार से मिलाए। इसके बाद बचा हुआ पानी मिलाकर अच्छी प्रकार से हिलाएँ। दवाई की मात्रा को एक हेक्टर के लिए जरूरी पानी की मात्रा में मिलाएं जब कि आपको उच्च आयतन छिड़काव उपकरणों का जैसे पीठ पर लादने वाला, हस्तचालित दबाव वाला छिड़काव यंत्र का प्रयोग करें । यह पीठ पर लादने वाला शक्तिचालित छिड़काव यंत्र द्वारा निम्न आयतन छिड़काव विधि से भी उपयोग की जा सकता है।

मिश्रणशीलता : मेटालेक्सिल + मेन्कोजेब धुलनशील पाउडर समान्यतः सभी कीटनाशकों और फफुंदीनाशको के साथ मिलाया जा सकता है सिवाय चता–गंधक (लाइम सल्फर) के।

सावधानियां : छिड़काव का घोल बनाने के लिए खाना परोसने के बर्तनों का इस्तेमाल न करें। घोल बनाते समय छड़ी का उपयोग करें।

त्वचा से संपर्क बचाने के लिए हाथों में दस्ताने पहने दवा आखों में न लगने दें और न ही उसे सांस द्वारा अन्दर जाने दें। छिड़काव का साफ सुरक्षात्मक कपड़े, मास्क व गोगल्स पहने और छिड़काव के पुहारों से बचें। बोतल को मुँह से न फुंके और उपयोग के समय न खाएं, न पिये और न धुम्रपान करें, बचे हुए घोल को दुसरे दिन के लिए न रखिए।

फव्वारे, बाल्टी और अन्य बर्तनों को इस्तेमाल के बाद रोजाना धों लें।

काम के बाद हाथ को साबुन व पर्याप्त पानी से धों लें, कपड़ा बदल लें, दूषित कपड़ों की भी धों लें, झरनों तालाबीं एवं अन्य जल स्त्रोंतों को इससे दूषित न करें । पानी नही तो बचा हुआ घोल फेंके और न ही फव्वारें वाल्टी या अन्य दूषित बर्तनों को उसमें धोंए।

जब मधुमाक्खियाँ क्रियाशील हो तब स्प्रे न करें। यदि निर्देशन मात्रा में उपयोग किया जाए तो पशुगन पर कोई विपरीत असर नहीं होता है। विष लक्षण नजर आने से ही डॉक्टर की सलाह लें।

जहरीलापन : चूहों के लिए मौखिक (oral) एल.डी. 50, 5000 मि.ग्रा/कि.ग्रा. शरीर का वजन यह खरगोश के त्वचा को मध्यम खारीश (irritant) है और आखों के थोड़ा खारीश है।

विष के लक्षण एवं चिकित्सा : ज़हर के प्रभाव के निम्नलिखित लक्षण चूहों में देखे गयें है। ज्यादा उल्टी माना, सांस लेने में तकलीफ, शरीर पलटना, सिकड़ना, मांस पेशियों में बचाव त्वचा का सिकुडना ये लक्षण दिन बाद विलीन हो जाते है। ज़हर के लक्षण दिखाई देते ही डॉक्टर को बुलाइए। यदि बदन पर छींटें आदि पड़ जाए तो उन्हें साबुन मिश्रीत पानी से धो डालिये और दूषित कपड़ों के उतार कर प्रभावित व्यक्ति को खुली हवा में रखिए। दवाई को मूंह से अंदर जाने को स्थिति में उल्टी कराई जाए।

विषाक्त लक्षण : कोई खास बिषनाशक उपलब्ध नहीं है। ज़हर के लक्षण पर आधारित उपचार करना चाहिए।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बे बचा हुआ घोल तथा स्प्रे आदि की घूलाई का धानी सुरक्षित तरीके से नष्ट करे ताकि वातावरण दूषित न हों। २. खाली डिब्बे बाहर न फेंके ताकि उनका दूबारा उपयोग न हो सकें। ३. खाली डिब्बों को जलाकर, काटकर या बस्ती से दूरे जमीन में गाड़ कर नष्ट कर दें।

भण्डारण : १. फफुंदीनाशक के डिब्बें अलग जगह रखें जहां पर कोई और खास तौर पर खाने की वस्तु न रखी हो या फफुंदीनाशक की मात्रा (परिमाण) या प्रकार के अनुसार किसी अलग अलमारी में ताले के अंदर रखिये। २.भण्डारण की जगह मजबूत बनावट की, शुष्क, रोशनी और हवादार होने के साथ साथ काफी खुली होनी चाहिए ताकि जहरीली हवा असर न कर सकें।

चेतावनी : अनुभव से यह सिद्ध है कि फफुंद लगने से इस फफुंदनाशक से रसिस्टेन्ट (प्रतिकार शक्ति) हो सकता है जिस से दवाइयो के असर पर प्रभाव पड़ सकता है और फसल के उत्पादन में कमी आ सकती है। क्योंकि प्रतिकार शक्ति (रसिस्टेन्ट) को समय से पहले ही दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए हम इस विषय में किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेते है जैसे उत्पादन में कभी भी फसल पर बुरा असरे हो जाऐ, क्रिलाक्सील गोल्ड की उपयोग से, रसिस्टेन्टस का नियत्रण ना होने से।

जिम्मेदारी अस्वीकार : इस दवाई का उपयोग के तरीके उत्पादक के तत्कालीन प्रयोग पर आधारित है। कई बातें जैसे कि मौसम, भूमि का आकार, पौधे का किस्म, उनकी विरोधात्मक शक्ति, छिड़काव विधि आदि दवाई के असर पर प्रभाव चल सकती है। इसलिए उत्पादन के इस्तेमाल पर हमारा नियत्रण नहीं है इसलिए उत्पादन में एकरूप गुणवत्ता कायम रखने की जिम्मेदारी के अतिरिक्त और कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

हमारी कीटनाशक दवा हमारी सीलबन्ध पैकिंग में खरीदने पर ही निर्माता की ओर से उसकी गुणवत्ता की गारंटी है।

छिडकाव के २४ घंटे बाद क्षेत्र में प्रवेश करें।

चेतावनी: लेबल/लीफलेट में दी गयी फसलों के अलावा अन्य फसलों व कीटों पर इसका उपयोग न करें।

Hindi

KRILAXYL™ GOLD

Metalaxyl + Mancozeb 72% WP

(Systemic Fungicide)

Krilaxyl Gold is a protectant wettable powder fungicide containing a mixture of the systemic fungicide metalaxyl and the contact fungicide mancozeb. It contains 80 gm./kg. metalaxyl (8% m/m) and 640 gm./kg. mancozeb (64% m/m). Metalaxyl + Mancozeb ensures a double protection of the target plants during the period of active growth from the inside due to systemic activity of metalaxyl and from the outside due to contact activity of mancozeb.

Chemical Composition :

Metalaxyl, A.I.	8.0% m/m
Mancozeb, A.I.	64.0% m/m
Condensate of formaldehyde and Napthlene phenol sulfonic acid sodium salt or equivalent (Dispersing agent)	1.4% m/m
Stearyl - benzimidazole disulfonic acid, sodium salt or equivalent (Wetting agent)	0.6% m/m
Silicic acid (Carrier)	0.6% m/m
Kaolin	QS%
Total	100.0% m/m

Application : Krilaxyl Gold is recommended for the control of the following diseases.

Crop	Common name of disease	Dosage per hectare			Waiting period from last spray to harvest
		a.i. gm or % a.i.	Formu-lation (g.)	Diluted in water (lt.)	
Grapes	Downy Mildew	0.4% or 2000	0.5% or 2500	500	Not less than 7 weeks
	(Impose preventive foiler spray around 15-20 days of pruning and repeat application upto a maximum of 4 sprays at 10-14 days intervals or as soon as warm and wet weather conditions prevail predisposing crop to Downy mildew infection. Subsequently, change over to an alternative protectant fungicide as needed)				
Tobacco Nursery	Damping-off (Pythium aphanider- matum)	0.072% or 3600	0.1% or 5000	5000	Not less than 7 weeks
	Leaf blight/Black Shank (Phytophthora parasitica f.nicotianae)	0.14% or 1440	0.2% or 2000	1000	Not less than 7 weeks
	(Soil drench at sowing and spray at 30 days after sowing)				

Directions for Use : Measure out the required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation. Adjust the quantity of product in proportion to the water required to cover a hectare when high volume spray equipments such as knapsack sprayers, hand compression sprayers are used. It is also suitable for low volume application with motorised knapsack sprayers, mist blowers etc.

Compatibility : At recommended rates, Krilaxyl Gold is compatible with most other commonly used insecticides and fungicides except lime sulphur.

Precautions : Do not use cooking utensils for preparing spray. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protective clothing, mask, goggles, boots while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc. by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. Do not spray when bees are active. When used at recommended dosages, no adverse effect on wild life is expected. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor.

Toxicity : The acute oral LD_{50} to rat is greater than 5000 mg/kg. body weight. It is a moderate irritant to the skin and slight irritant to the eye of rabbits.

Poisoning Symptoms and Treatment : Under laboratory conditions the following unspecific poisoning symptoms were observed in rats. Sedation, dyspnoea, exophthalmus, curved posture and ruffled fur. In case of poisoning, call a physician immediately. In case of poisoning by ingestion through mouth victim should be induced to vomit. In case of external contamination wash off contamination by soap water and remove the contaminated clothes and keep the victim in fresh air.

Antidote : No specific antidote is known; apply symptomatic therapy.

Disposal of Containers : 1. Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed of in a safe manner as to prevent environmental water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage : 1. The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Warning : Experience has shown that strains of fungus resistant to metalaxyl may develop, resulting in a reduction in the efficacy of the product and thus in yield losses since the occurrence of resistance cannot be foreseen. We accept no responsibility for any loss of, or damage to crops resulting from the failure of Krilaxyl Gold to control the resistant strains.

Liability Clause : Recommendations for product usage are based on the latest level of expertise of the manufacturer. Many factors such as, weather and soil conditions, plant type, resistance, spraying technique and other applications may influence the effect of the product. Since the use of this product is beyond our control, we cannot assume any responsibility other than the uniform quality of the product. The manufacturer warrants the quality of the pruduct if acquired by the user in sealed, original packings.

Optimal re-entry period : 24 hrs.

Caution: Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet.

English

Read Instructions Leaflet before use

**उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पढ