Fipronil 5% SC
TZED™
(Insecticide)

TZED 5% SC is an insecticide used to control insects like Stem Borer, Brown Plant Hopper, Green Leaf Hopper, Rice Leaf Folder, Rice Gall Midge, White Backed Plant Hopper and Whorf Maggot on Rice, Diamond Back Moth on Cabbage, Thrips, Aphids and Fruit Borer in Chilli and Early Root and Shoot Borer in Sugarcane crops.

Chemical Composition :

Fipronil, a.i. (min. purity 90%)	5.000% w/w
Sunflower oil	5.000% w/w
Wetting agent (Sodium Ligno Sulphonate)	8.000% w/w
Sticking/Stabilizing agent (Carboxy Methyl Cellulose)	4.000% w/w
Dispersing agent (Sodium salt of Dinaphthyl Methanol sulphonic acid)	3.000% w/w
Blend of emulsifiers (Proprietory blend of alkyl phenol Ethoxylate, triglyceride ethoxylate, calcium alkyl benzyl sulphonate)	8.000% w/w
Water	Q.S. to make 100
Total:	**100.000% w/w**

Recommendations :

Crop	Common name of Disease	Dosages per Hactare			Waiting period between last spray and harvest
		a.i (g/%)	Formu-lation (g)	Dilution in water (ltrs)	
Rice	Stem Borer Brown Plant Hopper Green Leaf Hopper Rice Leaf Folder Rice Gall Midge White Backed Plant Hopper Whorf Maggot	50-75	1000 - 1500	500	32 days
Cabbage	Diamond Back Moth	40-50	800 -1000	500	7 days
Chilli	Thrips, Aphid Fruit borer	40-50	800 -1000	500	7 days
Sugar - cane	Early Shoot Borer Root Borer	75-100	1500 - 2000	500	9 months

Plant Protection Equipment :
High volume nozzle fitted to spray like Knapsack, air pressure foot pump, hard rocker or power operated spraying machine may be used.

Precaution :
1. Keep away from children, foodstuffs, empty foodstuff containers and animal food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and part of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning :
Irritability, lethargy, muscle tremors, convulsions may occur.

First Aid Measures :
1. In case of ingestion, make the patient vomit, except if person is unconscious. Make the patient drink a glass of water containing one table spoon of salt and tickle the back of the patient's throat with a finger to induce vomiting.
2. Skin contamination: Take off soiled clothing and wash affected parts carefully with soap and water.
3. Eye contamination: Flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4. Inhalation: Remove the patient to fresh air and call physician immediately.

Phytotoxicity :
The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote :
No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used Container :
1. Used packages or surplus materials and washings of insecticides and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions :
1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and the nature of the insecticides.
2. The store room or premises for storing the insecticides should be well lit, well built, dry, cool, ventilated and of sufficient dimensions, to avoid contamination with vapour.

Optimal re-entry period : 48 hrs.
Caution: Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet.

फिप्रोनिल 5% एस.सी
टीजेड™
(कीटनाशक)

टीजेड 5% एस सी एक कीटनाशक है जो कि धान के फसल में लगने वाले तना छेदक, भूरा माहू, हरा माहू, धान पत्ति मोड़क, राइस गॉलमिज, सफेद माहू तथा इल्ली जैसे कीट, बंदगोभी पर डाइमंड बैकमोथ, मिर्च पर थ्रीप, रसकीट तथा फल मोड़क एवं गन्ने मे लगने वाले जड़ एवं तना छेदक कीट को नियंत्रित करता है।

रैसायनिक संयोजन :

फिप्रोनिल ए.आई. (न्यूनतम शुद्धता 90%)	5.000% डब्ल्यू/डब्ल्यू
सूरजमुखि का तेल	5.000% डब्ल्यू/डब्ल्यू
तरलीकारक तत्व (सोडियम लिग्नो सल्फोनेट)	8.000% डब्ल्यू/डब्ल्यू
स्थिरकारी तत्व (कार्बोक्सी मिथाइल सेलूलोज)	4.000% डब्ल्यू/डब्ल्यू
विकिरन कारी तत्व (डिनाफथाइल मिथिनॉल सल्फोनिक एसिड का सोडियम लवण)	3.000% डब्ल्यू/डब्ल्यू
समकक्ष मिश्रण (अल्काइल फिनॉल इथाक्सीलेट का स्वामित्व कारी मिश्रण) ट्राइग्लाइसेराइड इथॉक्सीलेट, कैल्शियम अल्काइल बेनजाइल सल्फोनेट	8.000% डब्ल्यू/डब्ल्यू
जल	Q.S.100 बनाने के लिए
कुल :	**100.000% डब्ल्यू/ डब्ल्यू**

सिफारिश :

फसल	कीट का सामान्य नाम	प्रति हेक्टर मात्रा			प्रतीक्षा का समय पिछले स्प्रे से लेकर फसल तैयार होने तक
		ए.आई. (ग्राम/%)	फॉर्मूलेशन (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	
धान	तना छेदक, भूरा माहू, हरा माहू, धान पत्ति मोड़क, राईस् गॉल मिज, सफेद माहू, इल्ली	50-75	1000-1500	500	32 दिन
बंधागोभी	डायमंड बैकमोथ	40-45	800-1000	500	7 दिन
मिर्च	थ्रीप, रसकीट, फलमोड़क	40-50	800-1000	500	7 दिन
ईख	तना छेदक जड़ छेदक	75-100	1500-2000	500	9 महिने

फसल संरक्षण यंत्र :
छिड़काव के लिए उच्च परिमाण वाले नोजल लगाए जाए जैसे कि नैपसैक, वायु दबाव पौंव चलित पम्प, हार्ड रोकर या बिजली चलित स्प्रे मशीन प्रयोग किए जा सकते हैं।

सावधानियें :
1. बच्चों, खाद्य सामाग्रीयो, खाद्य सामाग्रीयो के खाली बर्तनो एवं पशु आहार से दूर रखें।
2. मुँह, आँख एवं चमडी के सम्पर्क में न लायें।
3. हवा की दिशा में ही छिड़काव करें, स्वाशग्रहण न होने दे।
4. छिड़काव के उपरांत दूषित वस्त्रों एवं शरीर के अंगो को पूरी तरह धोलें।
5. छिड़काव के क्रम मे धुम्रपान न करें, न ही कोई वस्तु खाँए, पिएँ या चबाएँ।
6. मिलाते और छिड़काव करते समय पूर्णतः सुरक्षित वस्त्र पहनें।

विशाक्तता के लक्षण :
उत्तेजना, अस्वाभाविक तन्द्राचछन्न अवस्था, मांसपेशियो का स्फूरणन, पेशियो सहित पूरे शरीर मे कम्पन हो सकता है।

प्राथमिक चिकित्सा के उपाय :
1. पी लेने के मामले में रोगी को उल्टी करवाएँ बशर्ते रोगी बेहोश न हुआ हो। एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक मिला कर रोगी को पिलाएँ तथा रोगी के गले में अंगुली डालकर उसे उल्टी करवाएँ ।
2. त्वचा से सम्पर्क होने पर – गंदे कपड़ों को उतार दें तथा प्रभावित अंग को साबुन और पानी से सावधानीपूर्वक धोएँ ।
3. आँखो का संक्रमण : 10 से 15 मिनट तक प्रचूर स्लाइन /साफ जल से धोएं।
4. सांस में चले जाने पर – रोगी को खुली हवा में ले जाएँ एवं डॉक्टर को तुरंत बुलाएँ ।

सहनशीलता :
अनुमोदित मात्रा मे छिड़काव करने पर कोई विपरीत प्रतिक्रिया नही है।

विषनाशक :
कोई विशेष विषनाशक ज्ञात नही है। लक्षण के अनुसार इलाज करें।

व्यवहृत पात्रों को हटा देना :
1. व्यवहृत पैकेजों अथवा व्यवहृत पात्रों एवं कीटनाशक धोने के बाद अवशेष पदार्थ तथा पात्रों को इस प्रकार से सुरक्षित रूप से हटा देना चाहिए जिससे कि पर्यावरण एवं जल प्रदूषित न हो।
2. व्यवहृत पैकेजों को इस प्रकार के हटाया जाय जिससे कि उनके दुबारा व्यवहार पर रोकथाम हो।
3. पैकेजों को तोड़–मरोड़ कर उन्हें निवास स्थानों से दूर मिट्टी के अंदर गाड़ देना चाहिए ।

कीटनाशक का रखरखाव :
1. कीटनाशकों के पैकेजों को अलग कमरों या अलग परिसरों में रखना चाहिए। अन्य पदार्थों विशेष कर खाद्य पदार्थों से दूरी पर स्थित होना चाहिए एवं कीटनाशक के परिमाण और वह किस प्रकार का है उसके अनुसार उसे अलग से अलमारी में ताला बंद करके रखा जाना चाहिए।
2. स्टोर कमरे या परिसर जहाँ पर कीटनाशक रखे जाते हैं वहाँ पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए तथा वह स्थान अच्छी तरह से निर्मित हो, सूखा हो, ठंडा हो, हवा का आवागमन और पर्याप्त आवतन युक्त हो जिससे आर्द्रता के कारण वह स्थान दूषित न हो सके।

छिड़काव के 48 घंटे बाद क्षेत्र में प्रवेश करें।
चेतावनी: लेबल/लीफलेट में दी गयी फसलों के अलावा अन्य फसलों व कीटों पर इसका उपयोग न करें।

ফিপ্‌ৰোনিল ৫% এস সি
টিজেড্‌™
(কীটনাশক)

টিজেড্ ৫% এস.সি কীটনাশকটি ব্যবহার করা হয় মাজরা, বাদামী শোষক, সবুজ শ্যামা পোকা ; ধানের পাতা মোড়া, সাদা পিঠওলা শোষক পোকা, হোর্ল ম্যাগট, বাঁধাকপির হীরক পৃষ্ঠ প্রজাপতি, চিকলী পোকা, জাব পোকা, লংকার ফল ছেদা পোকা এবং আখের শেকড় ও কাণ্ড ছেদা পোকা দমনের জন্য ।

ৰাসায়নিক উপাদান :

ফিপ্‌ৰোনিল মূল উপাদান (কমপক্ষে ৯০% বিশুদ্ধতা)	৫.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
সূর্যমুখী তেল	৫.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
ভেজা পদার্থ (সোডিয়াম লিগনো ছালফোনেট)	৮.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
চটচটে/স্টেবিলাইজিং পদার্থ (কাবর্বক্সি মিথাইল সেলুলোজ)	৪.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
ছড়িয়ে দেওয়া বস্তু (ডাইন্যাপথাইল মিথানল সালফেনিক এ্যাসিডের সোডিয়াম সল্ট)	৩.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
ইমালসিফাইয়ারের সংমিশ্রণ (এ্যালকাইল ফিনল ইথোক্সিলেট ট্রাইগ্লিসারাইড ইথক্সিলেট, ক্যালসিয়াম এ্যালকাইল বেনজাইল সালফোনেট)	৮.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
জল	কিউ.এস ১০০ করার জন্য
মোট :	**১০০.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ**

অনুমোদন :

ফসল	পোকার চলতি নাম	হেক্টর প্রতি মাত্রা			শেষ ওষুধ এবং ফসল তোলার মধ্যে ন্যূনতম ব্যবধান
		মূল উপাদান (গ্রা / %)	তৈরী ওষুধ (গ্রাম)	জলে দ্রবণ (লিটার)	
ধান	মাজরা, বাদামী শোষক, সবুজ শ্যামা পোকা ; পাতা মোড়া, ডেঁপু পোকা, সাদা পৃষ্ঠ শোষক পোকা, হোর্ল ম্যাগট	৫০–৭৫	১০০০–১৫০০	৫০০	৩২ দিন
বাঁধাকপি	হীরক পৃষ্ঠ প্রজাপতি	৪০–৫০	৮০০–১০০০	৫০০	৭ দিন
লংকা	চিকলী পোকা, জাব পোকা, ফল ছেদা পোকা	৪০–৫০	৮০০–১০০০	৫০০	৭ দিন
আখ	কাণ্ড ছেদা পোকা, শেকড় ছেদা পোকা	৭৫–১০০	১৫০০–২০০০	৫০০	৯ মাস

শস্য সংরক্ষণ যন্ত্রপাতি :
উচ্চ চাপের নজল দেওয়া স্প্রেয়ার যেমন ন্যাপস্যাক, হাওয়া চাপের পা পাম্প, শক্ত রকার অথবা যন্ত্র চালিত স্প্রেয়িং যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

সাবধানতা :
১। শিশু, খাদ্যদ্রব্য, খালি খাদ্য দ্রব্যের বাক্স এবং পশুখাদ্যের নাগালের বাইরে রাখা উচিত।
২। মুখ, চোখ এবং চামড়ার স্পর্শ এড়ানো উচিত ।
৩। স্প্রেয়র ধোঁয়া নিশ্বাসে নেওয়া এড়ানো উচিত । হাওয়ার গতির দিকে স্প্রে করা উচিত।
৪। স্প্রে করার পর জামাকাপড় ও শরীরের অংশ ভাল করে ধুয়ে ফেলা উচিত।
৫। স্প্রে করার সময় ধূমপান, পান করা, খাওয়া বা কোন কিছু চেবানো উচিত নয়।
৬। ওষুধ মেশানোর সময় ও স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ গা ঢাকা জামাকাপড় ব্যবহার করা দরকার।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ :
জ্বালা পোড়া, অলসতা, পেশী সংকোচন, খিঁচুনী ইত্যাদি।

প্রাথমিক চিকিৎসা :
১। গলাধঃকরণ করে ফেললে রুগীকে বমি করাতে হবে যদি না ব্যক্তিটি অচৈতন্য থাকে । রুগীকে এক গ্লাস জলে এক চামচ নুন মিশিয়ে পান করিয়ে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করাতে হবে।
২। চামড়ায় বিষক্রিয়া : ওষুধে ভেজা জামা কাপড় গা থেকে খুলে ফেলে সংক্রমিত শরীরের অংশ ভালভাবে সাবান জলে ধুয়ে ফেলতে হবে।
৩। চোখের বিষক্রিয়া : ১০–১৫ মিনিট সাদা অথবা নুনজল দিয়ে চোখে ঝাপটা দিতে হবে।
৪। বিষের ধোঁয়া নিশ্বাসে নিয়ে নিলে রোগীকে মুক্ত জায়গায় বিশুদ্ধ বায়ুতে নিয়ে যেতে হবে এবং ডাক্তার ডাকতে হবে।

গাছের কু–প্রভাব :
অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহারে গাছের উপর কোন কু–প্রভাব নেই।

প্রতিষেধক :
কোন নির্ধারিত প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করা দরকার।

ব্যবহৃত ঢোড়কের বিনষ্টিকরণ :
১। ব্যবহৃত মোড়ক অথবা অতিরিক্ত ওষুধের বিনষ্টিকরণ এবং ধোয়াধুয়ী সাবধানতার সঙ্গে করা উচিৎ যাতে জল বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের দূষণ না হয়।
২। ব্যবহৃত মোড়কের পুনঃ ব্যবহার রোধ করতে মোড়ক বাইরে ফেলা উচিৎ নয়।
৩। ব্যবহৃত মোড়ক নষ্ট করে বাসস্থান থেকে দূরে পুঁতে ফেলা উচিৎ ।

গুদামজাতকরণের শর্তাবলী :
১। কীটনাশক ভর্তি মোড়ক আলাদা ঘরে বা জায়গায় এবং খাদ্যবস্তু বা অন্যান্য জিনিসের থেকে দূরে রাখতে হবে অথবা কীটনাশকের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী আলাদা আলমারিতে তালা চাবি দিয়ে রাখতে হবে।
২। কীটনাশক রাখার ঘর অথবা জায়গা মজবুত, আলো বাতাসযুক্ত অথচ শুষ্ক ও ঠান্ডা হওয়া দরকার এবং চারিদিকে কিছু ফাঁকা জায়গা থাকা দরকার যাতে কীটনাশকের ধূমায়িত বিষক্রিয়ার সংক্রমণ এড়ানো যায়।

ছিটিয়ে দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর এলাকায় প্রবেশ করুন।
সতর্কতা ঃ এই লেবেল / লিফলেটে নির্দিষ্ট ভাবে লিখিত শস্য ছাড়া অন্য কোন শস্যে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

ফপ্রোনিল ৫% এস্ সি
টিজেড্™
(কীটনাশক)

টিজেড্ ৫% এস্‌সি কীটনাশক যথা ধান্যবিন্ধা, ধূসর উঁয়াঁ পোক, সবুজ উঁয়াঁ পোক ধান পত্তমোড়া পোক, ধানের গল্ মিজ, হ্বাইট্ বেমাকৃত পোক্কা, হোর্ল ম্যাগট, বাঁধাকপির হীরক পৃষ্ঠ প্রজাপতি, চিকলী পোকা, জাব পোকা, লংকার ফল ছেদা পোকা এবং আখের শেকড় ও কাণ্ড ছেদা পোকা দমনের জন্য ।

ৰাসায়নিক উপাদান :

ফিপ্রোনিল, ৭ আল (সর্বনিম্ন শুদ্ধতা ৯০%)	৫.০০০% ডব্লু/ডব্লু
সূর্যমুখী তেল	৫.০০০% ডব্লু/ডব্লু
ভেজা পদার্থ (সোডিয়াম লিগনো ছালফোনেট)	৮.০০০% ডব্লু/ডব্লু
এটিপ্ট এডেন্ট (সোডিয়াম কিরুলো ঘরুলটোনেট)	৪.০০০% ডব্লু/ডব্লু
স্থিকিং/স্থবিলাইজিং এডেন্ট (কাবরক্সি মিথাইল সেলুলোজ)	৪.০০০% ডব্লু/ডব্লু
ডি–স্পর্সাই এডেন্ট (সোডিয়াম ঘরুলফেট ডিনাফাথ্‌ল্ মেথানল ঘরুলফোনিক এসিড)	৩.০০০% ডব্লু/ডব্লু
ইমালসিফাইয়ার এডেন্ট (এ্যালকাইল ফিনল ইথোক্সিলেট ট্রাইগ্লিসারাইড ইথক্সিলেট, ক্যালসিয়াম এ্যালকাইল বেনজাইল সালফোনেট)	৮.০০০% ডব্লু/ডব্লু
পানী	Q.S. ৳ ১০০ করিবাপাই
মোট	**১০০.০০০% ডব্লু/ডব্লু**

সুপারিশ করাযাইছে :

ঔষধ	ঘোরুর সাধারণ নাম	হেক্টর প্রতি মাত্রা			শেষ স্প্রেয়র এবং ফসল তোলার মধ্যে ন্যূনতম প্রতীক্ষা নিষ্পাদ
		এ.আই. (ঙ /%)	সূত্র (ঙ)	পানীয়ের দ্রবণ (লিটর)	
ধান	ধান্যবিন্ধা, ধূসর ঘুমুক হুপত্র, ঘ্রাদ্ লিপ্ হপত্র, ধানবত্তুগোধাপোক ধান গল্মিন্ হ্বাইট্ ব্যাকড্ ঘুমুক হুপত্র ঘোপ্‌ক্ষ মাগ্‌ট	৪০–৩৪	১০০০–১৪০০	৪০০	৩৭ দিন
বাঁধাকপি	হীরক পৃষ্ঠ প্রজাপতি	৪০–৫০	৮০০–১০০০	৫০০	৭ দিন
লংকা	চিকলী পোকা, জাব পোকা, ফল ছেদা পোকা	৪০–৫০	৮০০–১০০০	৫০০	৭ দিন
আখ	ষ্ট্রাপ্‌হপ অ্যাপ্‌পিড্ ফপ্‌হপ্‌ক্ষ	৪০–৪০	৮০০–১০০০	৪০০	৩ দিন
আখু	মাটক ঘাঙ্কবিন্ধা মূল বিন্ধা	৩৪–১০০	১৪০০–১০০০	৪০০	৫ মাস

ঘাঙ্ক ঘুলুগ্রা ঘগুবঙ্গ :
ঘাঙ্ক ঘুলুগ্নগ ঘকন্ড ঘিঁচ করাগারগুগ্রা ঘ্রে যথা ন্যাগ্‌যাঙ্ক্ এয়াঙ্ক ঘুগেরু ঘুন্ড্ ঘগ্ন, ঘার্ড ঘরুবু ঘিঁয় পাগ্রাঙ্গ ঘ্যাগ্রা ঘাঙ্কিন্ ঘ্বুলঙ্গ নেগ্রিন্ ব্যবহার করাযাইগাছে ।

ঘাবঙ্গনগ :
১. শিশু, ঘাদ্যন্ন পদার্থ, ঘালি ঘাদ্যন্ন পদার্থ ঘন্নুগুগ্রা পান্ত্র এবং পশুঘাদ্যন্নগাঙ্গু দূরেরে ঘন্নবু ।
২. পাঁর্থি, আঁখি, ঘুবর ঘাগিবাগু বিঅন্নু নাঁই ।
৩. ঘ্রে ঘন্নাঙ্গেরে বাঙ্গুন্নু ঘুঁঘুন্নু নাঁই, পবন ঘন্নুগুগ্রা দিবনু ঘ্রে ঘবনু ।
৪. ঘ্রে ঘবি ঘাগিবা পরে ঘাগিগুগ্রা ঘুঙ্গাঘর এবং ঘবেন্নু ঘবঙ্গাবে ধোঙ্গ পঙ্গান্নু ।
৫. ঘ্রে ঘন্নুগ্রা বেরে ধূমপান, পানীয়গুন্নঙ্গ, ঘ্রাঙ্গবা বা চোবাঙ্গবা ঙ্গাঁঘঙ্গবনু নাঁই ।
৬. মিঙ্গ্ বা ঘ্রেগ্নঙ্গ ঘন্নাবেরে ঘুবঙ্গাঙ্গাঙ্গা পোশাঙ্গ ঘিঅন্নু ।

বিষক্রিয়াগ লক্ষণ :
ঘেবেন্নুঙ্গাঙ্গবেরবা, চিব্‌বেরে হোঙ্গ পঙ্গিবা, মাংস্পেশাগ ঙ্গঙ্গন, ঘ্বাঙ্গবিঙ্গ চুর্বলতা ।

প্রাথমিক চিকিৎসা :
১. যদি বেবেন্নু ঘাঙ্গঅাগু, রোগাগ অবেরে হোঙ্গ যাঙ্গ নগুঙ্গে ঘাঙ্গি করাঙ্গবাঙ্গু বেঙ্গ্য করুন্নু । রোগাঙ্গু এক গ্লাস জলে এক চামচ নুন মিশিয়ে পান করিয়ে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করাতে হবে।
২. চামড়ায় বিষক্রিয়া : ওষুধে ভেজা জামা কাপড় গা থেকে খুলে ফেলে সংক্রমিত শরীরের অংশ ভালভাবে সাবান জলে ধুয়ে ফেলতে হবে।
৩. চোখের বিষক্রিয়া : ১০–১৫ মিনিট সাদা অথবা নুনজল দিয়ে চোখে ঝাপটা দিতে হবে।
৪. নাকঙ্গু যাঙ্গঅগুবেরে : রোগাঙ্গু নুন্নুবাঙ্গু বঙ্গাবঙ্গ ঘ্লাঙ্গনু নেঙ্গযাঅাঙ্গু এবং শ্রাগ্র বাঙ্গুবঙ্গু ঙ্গবাঙ্গু ।

ফাঁঙ্গবোঙ্গুবিঁবি :
ঘঁঙ্গ্ব–ঙ্গেবেনঙ্গেঙ্গঙ্গ অনুযাঙ্গে ব্যবহার ঙ্গবেঙ্গ ঙ্গঅাঙ্গাবনঙ্গি ফাঙ্গবোঙ্গুবিঁ নুগুবেঁ ।

প্রতিঙ্গেঅঙ্গ :
ঙ্গেঙ্গিঅি নির্দিষ্ট প্রতিঙ্গেঅঙ্গ ঙ্গঅাগাঁই ঙ্গঅঙ্গ অনুযাগে চিকিৎসা করা দরকার ।

ব্যবহৃত ঘ্যাগেক্টি ঘাগন্তা বর্জন :
১। ব্যবহৃত ঘ্যাগেক্টি ঘাগন্তা বা ব্যবন্না নিষ্ক্রিত ঙ্গাগন্নাঙ্গক এবং ঙ্গাগন্নাঙ্গক পাঙ্গুঙ্গিত ঘৌগ দূষিত পাঙ্গীঙ্গু নিঙ্গাগব ঙ্গ্লাগেরে বর্জন করিবাঙ্গু ঙ্গেবে, যেগেরি পিরিবেন্ন বা পাঙ্গী দূষঙ্গ নহুব ।
২। ব্যবহৃত ঘ্যাগেক্টি ঘাগন্তাগু পুনর্ব্যবহার রোঙ্গবিবা পাঁই বেঙ্গুঙ্গিবু ঙ্গবগুঙঃ পঙ্গাগু নাঁই ।
৩। ঘ্যাগেক্টি ঘাগন্তাগু জনবরঙ্গিঁাগু দূরেরে নেন্ন ঘাঙ্গি পোঙ্গিবেন্ন। আঙ্গঙ্গ্বন্ন ।

ঙ্গাগন্নাঙ্গক ঙ্গঙ্গিবা ব্যবন্থা :
১। ঙ্গাগন্নাঙ্গক ঘ্যাগেক্টেগুঙ্গি ঙ্গ্বতন্ত্র ঙ্গর বা ঙ্গাগাঙ্গে ঙ্গঙ্গিবা আবঙ্গ্যক । বিঙ্গেঙ্গবরি ঙ্গাঙ্গঅ ঘাগন্তা বঙ্গুবুগ্রি ঙ্গবরুগ্রিবাগু দূরেরে আঙ্গবা ঙ্গাগন্নাঙ্গবর পরিগাঙ্গ এবং ঙ্গা'ঙ্গ বৈঙ্গিষ্ট্য অনুযাঙ্গায় পৃথক আঙ্গমাগারেরে ঙ্গাঙ্গা বেঙ্গ্ন ঙ্গঙ্গিবা ঙ্গঙ্গিঅ ।
২। ঙ্গাগন্নাঙ্গক ঙ্গঙ্গিবা ঙ্গর বা ঙ্গাগা নবুঙ্গুবরেরে ঙিআঁ বোঙ্গবুগ্রা বরনাঙ্গ, আঙ্গোঙ্গিব, শুষ্ক, আঙ্গা, ঙ্গঅন বায়ুঙ্গ ঙ্গবাঙ্গব এবং ঘাঙ্গাঙ্গিব ঘোঙ্গ সংক্রমিত নঙ্গেবো পাঁই প্রস্তুত পরিবরবিঙ্গিন্তু বেঙ্গা বরনাঙ্গ ।

ঙ্গাগন্নবেরে নাঙ্গব ব্যবন্থাগ ঙ্গ ৪৮ ঙ্গঙ্গ্ব পরে ই ঙ্গেঅবেরে প্রবেঙ্গ করুন্নু ।

বেবোবনা : ঙ্গেবঙ্গ্ / ঙিত্‌ঙ্গেব্ রে বৈঙ্গাঙ্গাঙ্গগুবা ঙ্গবন্ন ব্যবন্থাগ অন্য ঙ্গবন্ন এবং ঙ্গাত ঙ্গঅরেরে ঙ্গঅাঙ্গ প্রয়োগ করুন্নু নাঁই ।

ফিপৰ'নিল ৫% এছ চি
টিজেড্™
(কীটনাশক)

টিজেড্ ৫% এছ.চি কীটনাশকটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় মাজৰা, বাদামী শোষক, সেউজীয়া শ্যামা পোক, ধানৰ পাত মেৰিওৱা, বগা পিঠিওলা শোষক পোক, হ'ল মেগট, বন্ধাকবিৰ হীৰক পৃষ্ঠ প্ৰজাপতি, ফণি পোক, জাব পোক, জলকীয়াৰ ফল বিন্ধা কৰা পোক আৰু কুঁহিয়াৰৰ শিপা আৰু কাণ্ড বা গা–গছ বিন্ধা পোক দমনৰ বাবে।

ৰাসায়নিক উপাদান :

ফিপ্‌ৰ'নিল মূল উপাদান (কমেও ৯০% বিশুদ্ধতা)	৫.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
সূৰ্যমুখী তেল	৫.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
ভিজা পদাৰ্থ (ছোডিয়াম লিগনো ছালফোনেট)	৮.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
এটা এঠা / ষ্টেবিলাইজিং পদাৰ্থ / কাবৰক্সি মিথাইল ছেলুলোজ)	৪.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
ডিঃবিতি কৰি দিয়া বস্তু (ডাইন্যাপথাইল মিথাইল ছালফোনিক এচিডৰ ছোডিয়াম ছল্ট)	৩.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
ইমালচিফাইয়াৰৰ সংমিশ্ৰণ (এলকাইল ফিনল ইথোক্সিলেট ট্ৰাইগ্লিছাৰাইছ ইথক্সিলেট, কেলছিয়াম এলকাইল বেনজাইল ছালফোনেট)	৮.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
পানী	কিউ.এছ ১০০ কৰাৰ বাবে
মুঠ :	**১০০.০০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ**

অনুমোদন :

শস্য	পোকৰ চলিত নাম	হেক্টৰ প্ৰতি মাত্ৰা			শেষ ঔষধ প্ৰয়োগ আৰু শস্য কটাৰ মাজতে ন্যূনতম ব্যৱধান
		মূল উপাদান (গ্ৰা:/ %)	তৈয়াৰী ঔষধ (গ্ৰা:)	পানীত দ্ৰবণ (লিটাৰ)	
ধান	মাজৰা, বাদামী শোষক সেউজীয়া শ্যামা পোক, পাত মেৰিওৱা, ডেঁপু পোক, বগা পৃষ্ঠ শোষক পোক, হ'ল মেগট	৫০–৭৫	১০০০–১৫০০	৫০০	৩২ দিন
বন্ধাকবি	হীৰক পৃষ্ঠ প্ৰজাপতি	৪০–৫০	৮০০–১০০০	৫০০	৭ দিন
জলকীয়া	ফণি পোক, জাব পোক, ফল বিন্ধা পোক	৪০–৫০	৮০০–১০০০	৫০০	৭ দিন
কুঁহিয়াৰ	কাণ্ড বা গা–গাছ বিন্ধা পোক, শিপা বিন্ধা পোক	৭৫–১০০	১৫০০–২০০০	৫০০	৯ মাহ

শস্য সংৰক্ষণ যন্ত্ৰপাতি :
উচ্চ হেঁচাৰ নজল দিয়া স্প্ৰেয়াৰ যেনে নেপছেক, হাৱা হেঁচাৰ ভৰি পাম্প, টান ৰকাৰ বা যন্ত্ৰ চালিত স্প্ৰেয়িং যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।

সাৱধনতা ঃ
১। শিশু, খাদ্যদ্ৰব্য, খালি খাদ্যদ্ৰব্যৰ বাচন আৰু জীৱ–জন্তুৰ খাদ্যৰ পৰা দূৰত ৰাখিব।
২। চকু, মুখ আৰু ছালৰ সংস্পৰ্শলৈ যাতে নাহে তালৈ লক্ষ্য ৰাখিব।
৩। স্প্ৰেৰ কণিকা উশাহৰ লগত ভিতৰলৈ যাতে নাযায় তালৈ লক্ষ্য ৰাখিব বতাহ বলাৰ দিশত স্প্ৰে কৰিব।
৪। স্প্ৰে কৰাৰ পাছত দূষিত কাপোৰ–কানি আৰু শৰীৰৰ অঙ্গ–প্ৰত্যঙ্গবোৰ ভালদৰে ধুই পেলাব।
৫। স্প্ৰেৰ কৰাৰ সময়ত ধূমপান নকৰিব, কোনো পানীয় নাখাব আৰু অন্য কোনো বস্তু নাখাব।
৬। কীটনাশক মিশণ আৰু স্প্ৰেৰ কৰাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত কাপোৰ পিন্ধি লব।

বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণ :
জ্বলা পোৰা, অলসতা, পেশী সংকোচন, টানি ধৰা আদি।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা :
১। গলাধঃকৰণ কৰি পেলালে ৰুগীক বমি কৰাব লাগিব যদিহে ব্যক্তি জন অচৈতন্য নাথাকে। ৰুগীক এগিলাচ পানীত এচামুচ নিমখ মিহলাই পান কৰাই উভিত আঙুলি দি বমি কৰাব লাগিব।
২। গাত লাগিলে : গধুৰ কাপোৰ–কানি খুলি পেলাই ঔষধ লগা ঠাইত চাবোন পানীৰে ভালকৈ ধুই পেলাব লাগিব।
৩। চকুত লাগিলে : সাধাৰণ পানী বা নিমখ–পানীৰে ১০–১৫ মিনিট ধৰি ভালকৈ চকুত পানী ছটিয়াৰ লাগিব।
৪। নিশ্বাসত টানি ললে : ৰোগীক মুকলি ঠাইত তাজা বতাহত লৈ যাব লাগিব আৰু লগে লগে ডাক্তাৰ মাতিব লাগিব।

গছৰ কু–প্ৰভাব :
অনুমোদিত মাত্ৰাত ব্যৱহাৰৰ ফলত গছৰ ওপৰত কোনো কু–প্ৰভাব নাই।

প্ৰতিষেধক :
কোনো নিৰ্ধাৰিত প্ৰতিষেধক নাই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা কৰা দৰকাৰ।

ব্যৱহাৰ কৰা পেকেটৰ বিনষ্টিকৰণ :
১। ব্যৱহাৰ কৰা পেকেটক বা অতিৰিক্ত ঔষধৰ বিনষ্টিকৰণ আৰু ধুই–পখালি লোৱাটো সাৱধানতাৰ সৈতে কৰা উচিৎ যাতে পানী বা পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিবেশৰ প্ৰদূষণ নহয়।
২। ব্যৱহাৰ কৰা পেকেটৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে পেকেট বাহিৰত পেলাই দিয়া উচিৎ নহয়।
৩। ব্যৱহাৰ কৰা পেকেট নষ্ট কৰি বাসস্থানৰ পৰা দূৰৈত পুতি পেলোৱা উচিৎ।

গুদামজাতকৰণৰ চৰ্তাবলী :
১। কীটনাশক ভৰ্তি পেকেট বেলেগ কোঠালিত বা ঠাইত আৰু খাদ্যবস্তু বা আন আন বস্তুৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগিব বা কীটনাশকৰ প্ৰকৃতি আৰু পৰিমাণ অনুযায়ী বেলেগ আ

பிப்ரேனில் 5% எஸ்ஸி
டிஜெட்™
(பூச்சி கொல்லி)

டிஜெட் 5% எஸ்ஸி ஒரு பூச்சி கொல்லி. இது அரிசியில் வரும் ஸ்டெம் போரர், ய்ரௌன் ப்ளான்ட் ஹாப்பர், க்ரீன் லிஃப் ஹாப்பர், ரைஸ் லீப் ஃபோல்டர், ரைஸ் கால் மிட்ஜ், வைட் பேக்கிடு ப்ளான்ட் ஹாப்பர், மற்றும் வோர்ல் மாகோட் போன்ற பூச்சிகளையும், முட்டைக்கோஸில் வரும் டைமென்ட் பேக் மாத்தில், மிளகாயில் வரும் த்ரிப்ஸ், ஆபிட்ஸ் மற்றும் ப்ருட் போரர் போன்ற பூச்சிகளையும் மற்றும் கரும்பிலிருந்து வரும் ஏர்லீ ருட் மற்றும் ஷூட் போரர் போன்ற பூச்சிகளையும் கட்டுப்படுத்தும் பூச்சிக்கொல்லி.

ரசாயனக்கலவை :

பிப்ரோனில் ஏஐ (குறைந்த பட்சம் தூய்மை 90%)	5.000% w/w
ஸன் ப்லோவர் ஆயில்	5.000% w/w
வெட்டிங் ஏஜண்ட் (ஸோடியம் லிக்நோ சல்போநேட்)	8.000% w/w
ஸ்டிகிங்/ஸ்டேபிலைஸிங் ஏஜண்ட் (கார்பாக்ஸி மிதைல் ஸெல்லுலோஸ்)	4.000% w/w
டிஸ்பர்ஸீங் ஏஜண்ட் (டினாப்தைல்லின் ஸோடியம்ஸால்ட் மேதானோல்ஸல்போனிக் ஆஸிட்)	3.000% w/w
ஏமல்ஸிபையர்ஸின் கலவை (போப்ரைட்டரி ப்லண்ட்ஆப் ஆல்கைல் பினோல் ஏதோக்ஸைலேட், ட்ரைகிலிஸரைட் ஏதோக்ஸைலேட், கால்ஷியம் ஆல்கைல் சல்போனைட்)	8.000% w/w
தணணீர்	Q.S.100 ஆவதற்க்கு
மொத்தம் :	100.000% w/w

பரிந்துரைகள் :

பயிர்	நோய்களின் பொது பெயர்	அளவு பிரதி ஹெக்டருக்கு			காத்திருக்கும் காலம் கடைசி ஸ்பிரே முதல் அறுவடை நாள் வரை இடை வெளி
		எ.ஐ. (ஜி/%)	சூத்திரம் (க்ரெம்)	நீரில் கலவை (லிட்டர்கள்)	
அரிசி	ஸ்டெம் போரர், ப்ரோவ்ன் ப்ளான்ட் ஹாப்பர், க்ரீன் லீப் ஹாப்பர், ரைஸ் லீப் போல்டர், ரைஸ் கால் மிட்ஜ், வைட் பாக்கிடு ப்ளான்ட் ஹாப்பர், வோர்ல் மாகோட்	50-75	1000-1500	500	32 நாட்கள்
முட்டை கோஸ்	டைமென்ட் பேக் மாத்	40-50	800-1000	500	7 நாட்கள்
மிளகாய்	த்ரிப்ஸ், ஆபிட்ஸ், ப்ருட் போரர்ா	40-50	800-1000	500	7 நாட்கள்
கரும்பு	ஷூட் போரர்	75-100	1500-2000	500	9 மாதம்

பயிர் பாதுகாப்பு உபகரணம் :
ஹை வால்யூம் நாஜில் பொருத்தப்பட்ட ஸ்ப்ரே-உதாரணம்-நாப்ஸாக், ஏயர் ப்ரஷர் பூட் பம்ப், ஹாட் ராக்கர் அல்லது பவர் ஆபரேடட் ஸ்ப்ரேயிங் மெஷின்களை உபயோகிக்கலாம்.

முன்னெச்சரிக்கை :
1. குழந்தைகளிடமிருந்தும், சாப்பிடும் பொருட்களிடமிருந்தும், காலியான சாப்பிடும் பாத்திரங்களிடமிருந்து மற்றும் பிராணிகளின் உணவுகளிடமிருந்தும் இதை தூர வைக்கவும்.
2. வாய், கண் மற்றும் சருமத்துடன் தொடர்பு ஏற்படுவதை தவிர்க்கவும்.
3. தெளிப்பின் புகையை உட்சுவாசிப்பதை தவிர்க்கவும்.காற்றின் திசையிலேயே தெளிக்கவும்.
4. ஸ்ப்ரே செய்தப்பின் பாதிப்படைந்த துணிமணிகளையும் மற்றும் உடம்பின் அங்கங்களை நன்றாக கழுவவும்.
5. தெளிக்கும் பொழுது புகைக்கவோ, குடிக்கவோ, உண்ணவோ, சுவைக்கவோ கூடாது.
6. கலவை மற்றும் தெளிக்கும் சமயம் முழுமையாக பாதுகாப்பு தரும் உடைகளை அணியவும்.

விஷமேறுவதின் அறிகுறி :
கோபம் வறுவது, சோம்பேரித்தனம், தசை நடுங்குவது, வலிப்பு வுருவது விஷமேறியதின் அறிகுறிகள்.

முதலுதவி நடவடிக்கைகள் :
1) விஷம் உள்ளே சென்றுவிட்டால் நோயாளி மயக்கமாய் இல்லாவிட்டால் வாந்தி எடுக்க வையுங்கள். ஒரு ஸ்பூன் உப்பு கலந்த ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவைத்து தொண்டையில் விரலால் சிலிர்ப்பூட்டி வாந்தி எடுக்க வையுங்கள்.
2) சரும களங்கம் : அழுக்கு படிந்த துணிகளை கழட்டிவிட்டு பாதிக்கப்பட்ட அங்கங்களை சோப் மற்றும் தண்ணீரால் கழுவுங்கள்
3) கண்களங்கம் : அதிக அளவு உப்பு/சுத்த தண்ணீரால் 10 முதல் 15 நிமிடம் கழுவுங்கள்.
4) உட்சுவாசம் : நோயாளியை காற்றுள்ள பகுதிக்கு நகர்த்தி உடனடியாக மருத்துவரை அழையுங்கள்.

பைட்டோடாக்ஸிடி :
சிபாரிசு செய்யப்பட்ட முறையில் இந்த பொருளை உபயோகித்தால் இப்பொருள் பைட்டோடாக்ஸிக் அல்ல.

மாற்று மருந்து :
இதற்கு குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து ஏதும் இல்லை. அறிகுறிக்கேற்றப்படி சிகிச்சை தரவும்.

உபயோகமான பெட்டிகளை களைவது :
1) உபயோகமான பேக்கெட்டுகள், எஞ்சிய பொருட்கள் மற்றும் பூச்சிமருந்தை கலந்த பாத்திரங்கள் சுற்றுப்புறத்திற்கும் தண்ணீருக்கும் களங்கம் ஏற்படாதவாறு களையப்பட வேண்டும்.
2) உபயோகப்படுத்தப்பட்ட பேக்கெட்டுகள்அவை மறுபடியும் உபயோகம் ஆவதை தடுக்க வெளியே விட்டு வைக்கப்படக் கூடாது.
3) பேக்கேஜ்கள் உடைக்கபட்டு மனித நடமாட்டம் இல்லாத இடங்களில் புதைக்கப்பட வேண்டும்.

சேகரித்து வைக்கும் நிபந்தனைகள் :
1) பூச்சி மருந்து கொண்ட பேக்கேஜ்கள் தனிப்பட்ட இடத்திலோ அல்லது அறையிலோ மற்ற பொருட்கள், குறிப்பாக உணவுப் பொருட்கள் வைக்கப்பட்டு இருக்கும் இடத்திலிருந்து தள்ளி தனிப்பட்ட அலமாரிகளில், பூச்சி கொல்லியின் அளவு மற்றும் குணத்திற்கு ஏற்றவாறு பூட்டப்பட்டு வைக்கப்படவேண்டும்.
2) பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை சேகரித்துவைக்கும் அறையோ அல்லது இடமோ வெளிச்சத்துடன் நன்கு கட்டப்பட்டு, காய்ந்து குளுமையாக, காற்று வசதியுடன், போதிய பரிமாணத்தில் நீராவியுடன் தொடர்பு ஏற்படாதவாறு இருக்கவேண்டும்.

பிரத்யேக மறு நுழைவு காலம்: 48 மணி நேரம்.

எச்சரிக்கை: லீஃப்லெட்டில் கூறியது தவிர வேறு எந்த பயிரிலும் பிரயோகம் செய்வது கூடாது.

ఫిప్రోనిల్ 5% ఎస్‌సి
టిజెడ్™
(క్రిమినాశని)

టిజెడ్ 5% ఎస్‌సి, బోదెచిద్రకాలు, బ్రౌన్‌ప్లాంట్‌హాపర్, గ్రీన్‌లీఫ్ హాపర్, వరి ఆకుమడత, రైస్‌గాల్ మిడ్జ్, వైట్ బ్యాక్‌డ్ ప్లాంట్ హాపర్ మరియు వరిపై హొర్ల్‌మగ్గాట్, క్యాబేజిపై డైమండ్ బ్యాక్‌మోథ్, థ్రిప్స్, అఫిడ్స్ మరియు మిర్చి మరియు ఎర్లీరూట్‌లో ఫ్రూట్ బోరర్ మరియు చెరకు పంటకు పట్టు త్వరిత షూట్ బేరర్ వంటి క్రిములను అరికట్టుటకు వాడబడు క్రిమినాశని.

రసాయనిక కూర్పు :

ఫిప్రోనిల్, ఎ.ఐ. (కనీస శుద్ధత 90%)	5.000% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
సన్‌ఫ్లవర్ నూనె	5.000% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
వెటింగ్ ఏజెంటు (సోడియం లిగ్నో సల్ఫోనేట్)	8.000% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
స్టికింగ్ /స్టెబిలైజింగ్ ఏజెంట్ (కార్బోక్సీ మెథైల్ సెల్యులోజ్)	4.000% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
డిస్పర్సింగ్ ఏజెంటు (సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ డైనఫ్తీ మెథానొల్ సల్ఫోనిక్ అమ్లము)	3.000% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
ఎమల్సిఫైయర్స్ సమ్మేళనం (ఆల్కిల్‌ఫెనాల్ ఎథోక్సైలేట్ యొక్క ప్రాప్రైయిటరీ మిశ్రమం), ట్రైగ్లిసరైడ్ ఎథోక్సైలేట్, కాల్షియం ఆల్కైల్ బెంజీల్ సల్ఫోనేట్)	8.000% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
నీరు	క్యు.ఎస్. 100 చేయడానికి
మొత్తం :	100.000% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు

సిఫార్సు :

పంట	తెగులుయొక్క సాధారణ పేరు	హెక్టారుకి మోతాదు			చివరి స్ప్రే మరియు దిగుబడికి మధ్య వేచి ఉండు సమయం
		ఎ.ఐ. (గ్రా/%)	ఫార్ములేషన్ (గ్రా.)	నీటితో పలుచన విలీనీకరణము (లీ.)	
వరి	బోదెఛిద్రకాలు బ్రౌన్‌ప్లాంట్ హాపర్ గ్రీన్ లీఫ్ హాపర్ వరిఅకుమడత రైస్‌గాల్‌మిడ్జ్ వైట్ బ్యాక్ట్ ప్లాంట్ హాపర్ వొర్ల్‌మగ్గాట్	50-75	1000-1500	500	32 రోజులు
క్యాబేజి	డైమండ్ బ్యాక్ మత్	40-50	800-1000	500	7 రోజులు
మిర్చి	థ్రిప్స్ ఆఫిడ్ ఫ్రూట్ బోరర్	40-50	800-1000	500	7 రోజులు
చెరకు	త్వరిత షూట్ బోరర్ రూట్ బోరర్	75-100	1500-2000	500	9 నెలలు

మొక్కను సంరక్షించే సాధనం :
న్యాప్‌శాక్, ఎయిర్ ప్రెషర్ ఫుట్ పంపు, స్ప్రే చేయిటకు హార్డ్ రాకర్ లేక కరెంటుతో నడిచే స్ప్రేయింగ్ మెషీన్లు వంటి స్ప్రేలు, హైవాల్యూం నాజల్ కూర్చబడినవి వాడగలరు.

తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు :
1. పిల్లలు, తినుబండారాలు, తినే పదార్థాలకు వాడబడిన కంటెయినర్లు మరియు జంతువులు తినే పదార్థాల నుండి తగలకుండా దూరంగా ఉంచాలి.
2. నోటికి, కళ్లకి మరియు చర్మానికి తగల్చరాదు.
3. స్ప్రే పొగను పీల్చరాదు. గాలివాటు వైపుకు స్ప్రే చేయండి.
4. స్ప్రే చేసిన తరువాత కలుషితమైన బట్టలను, శరీర భాగాలను శుభ్రంగా నీటితో కడగండి.
5. స్ప్రే చేయు సమయంలో పొగత్రాగడం, తాగడం, తినడం, నమలడం వంటి పనులు చేయరాదు.
6. మిక్స్ చేసేటప్పుడు మరియు స్ప్రే చేయు సమయంలో పూర్తి రక్షణ నిచ్చే దుస్తులు వేసుకోవాలి.

విషలక్షణాలు :
దురదలు, నీరసం, కండరాలు అదురుట, మూర్ఛరోగం కనుపించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స :
1. విషం మ్రింగిన ఎడల, ఆతను స్పృహలో ఉంటే రోగికి వాంతి చేయించండి, వాంతి చేయించడానికి రోగికి ఒక చెంచా ఉప్పు వేసిన నీటిని గ్లాసులో తాగించి రోగి గొంతులో వ్రేలునుదోపి ప్రయత్నించండి.
2. చర్మంతో సంబంధం : మురికి సంబంధిత దుస్తులు తీసివేసి, సోకిన భాగాలను జాగ్రత్తగా సబ్బు మరియు నీటితో కడగండి.
3. కంటితో సంబంధం : 10 నుండి 15 నిమిషముల వరకు ఉప్పునీటి / శుభ్రమైన నీటితో కడుగండి.
4. లోనికి పీల్చినచో : రోగిని తాజాగాలి వచ్చు బయటి వాతావరణమునకు చేర్చి డాక్టరును వెనువెంటనే పిలువండి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ :
ఈ మందు సిఫార్సు చేయబడిన విధంగా వాడినచో ఫైటోటాక్సిక్ కాదు.

విరుగుడు :
ప్రత్యేక విరుగుడేమీ లేదు. లక్షణాలని బట్టి చికిత్స చేయాలి.

వాడిన కంటెయినర్లు పారవేయు విధానం :
1. పరిసరప్రాంత కాల్యుషం మరియు నీటికాలుష్యంను అరికట్టడానికి, వాడిన ప్యాకేజీలు మరియు మిగిలిన సరుకులు, క్రిమినాశక మందులు మరియ కంటెయునర్లు కడిగిన నీరును సురక్షితంగా పారవేయవలెను.
2. వాడిన ప్యాకేజీలు తిరిగి వాడబడకుండా బయట వదిలిపెట్టరాదు.
3. ప్యాకేజీలు పగులగొట్టి వాడుకకు అలవికాకుండా పాతిపెట్టవలెను.

నిలువ :
1. క్రిమినాశనిగల ప్యాకేజీలు, ముఖ్యంగా తిండిపదార్థాలకు దూరంగా విడివిడి గదులలో లేక ప్రెమిసెస్ నందు, మిగతా పదార్థాలను నిలువచేయుటకు వాడబడే గదులకు దూరంగా నిలవ చేయవలెను. ప్రత్యేక అలమారులలో తాళంవేసి వాటి పరిమాణం మరియు క్రిమినాశని యొక్క తరహా ననుసరించి జాగ్రత్త చేయవలెను.
2. క్రిమినాశనిలను భద్రపరచే స్టోర్‌రూమ్‌లు, ప్రెమిసెస్ వెలుతురు బాగుగా కలిగి, చక్కగా కట్టబడి, పొడి, చల్లని, గాలి ప్రసరింప చేసే విధంగా తగిన కొలతలతో కట్టబడాలి ఇంతేగాక, ఆవిరితో కలయిక పనికిరాదు.

పిచికారి చేసిన పిదప ప్రవేశించు వ్యవధి : 48 గంటలు

హెచ్చరిక : లేబుల్/లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొనిన పంటలకు కాకుండా ఇతర పంటలకు దీనిని వాడకూడదు.

ഫിപ്രൊനിൽ 5% എസ്സി
സേഡ്™
(കീടനാശിനി)

സേഡ് 4% എസ്സി തണ്ടുതുളപ്പാൻ, ബ്രൗൺ പ്ലാന്റ് ഹോപ്പർ, ഗ്രീൻലീഫ് ഹോപ്പർ, നെല്ലിന്റെ ഇലമടക്കി, റൈസ് ഗാൽ മിഡ്ജ്, വൈറ്റ് ബാക്ക്ഡ് പ്ലാന്റ് ഹോപ്പർ എന്നിവകളെ കൂടാത നെല്ലിലെ വോൾ മാഗോട്ട്, കാബേജിലെ ഡയമണ്ട് ബാക്ക് മോത്ത് ത്രിപ്സ്, ആപിഡ്സ്, മുളകിലെ ഫ്രൂട്ട് ബോറർ, കരിമ്പ് വിളയിലെ ഏർലി റൂട്ട്, ഷൂട്ട് ബോറർ എന്നിവകളെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

രാസായനിക മിശ്രണം :

ഫിർപ്പോനിൽ, എ.ഐ. (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശുദ്ധത90%)	5.000% w/w
സൂര്യകാന്തി എണ്ണ	5.000% w/w
വെറ്റിംഗ് ഏജന്റ് (സോഡിയം ലിഗ്നോ സൾഫോണേറ്റ്)	8.000% w/w
സ്റ്റിക്കിംഗ്/സ്റ്റാബിലൈസിംഗ് ഏജന്റ് കാർബോക്സി മെതിൽസെലുലോസ്)	4.000% w/w
ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ് (സോഡിയം സാൾട്ട് ഓഫ് ഡിനാഫ്ത്തിൽ മെന്താനോൾ സൾഫോണിക് ആസിഡ്)	3.000% w/w
ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ഇമൽസിഫയേഴ്സ് (പ്രൊപ്രൈ റ്ററി ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഫെനോൾ എതോക്സിലേറ്റ്), ട്രൈഗ്ലിസിറൈഡ് എത്തോക്സിലേറ്റ്, കാൽസിയം ആൽക്കൈൽബെൻസിൽ സൾഫോണേറ്റ)	8.000% w/w
വെള്ളം	Q.S.100 തികയ്ക്കുവാൻ
മൊത്തം :	100.000% w/w

ശുപാർശകൾ :

വിള	രോഗത്തിന്റെ സാധാരണ പേര്	ഓരോ ഹെക്ടറിനും ഡോസേജ്			കാത്തിരിക്കേണ്ട സമയം വിളവെടുപ്പിനും അവസാന സ്പ്രേക്കും ഇടയ്ക്ക്
		a.i. (g/%)	രൂപീകരണം (ജി)	വെള്ളത്തിൽ കലർത്തൽ (ലിറ്റർ)	
നെൽ	തണ്ടുതുളപ്പാൻ ബ്രൗൺ പ്ലാൻറ് ഹോപ്പർ ഗ്രീൻ ലീഫ് ഹോപ്പർ റൈസ് ലീഫ് ഫോൾഡർ റൈസ് ഗാൽ മിഡ്ജ് വൈറ്റണ ബാക്ക്ഡ് പ്ലാന്റ് ഹോപ്പർ വേൾ മാഗ്ഗോട്ട്	50-75	1000-1500	500	32 ദിവസം
കാബജേ്	ഡയമണ്ട് ബ്ക്ക് മോത്ത്	40-50	800-1000	500	7 ദിവസം
മുളക്	ത്രിപ്സ് ആഫിഡ്	40-50	800-1000	500	7 ദിവസം
കരിമ്പ്	ഫ്രൂട്ട് ബോററർ ഏർലി ഷൂട്ട് ബോറർ റൂട്ട് ബോറർ	75-100	1500-2000	500	9 മാസം

സസ്യ സംരക്ഷണ ഉപകരണം :
നാപ്സാക്ക്, എയർ പ്രഷർ ഫൂട്ട് പമ്പ്, ഹാർഡ് റോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓപ്പറേറ്റഡ് സ്പ്രേയിംഗ് മെഷിൻ എന്നീ ഹൈ വോള്യും നോസിലുകളുള്ള ഉകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

മുൻകരുതലുകൾ :
1. കുട്ടികൾ, ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, ഒഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണപദാർത്ഥ പാത്രങ്ങൾ, കാലിത്തീറ്റ എന്നിവകളിൽ നിന്നും അകറ്റി സൂക്ഷിക്കുക.
2. വായ്, കണ്ണുകൾ, ചർമ്മം എന്നിവകളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക.
3. സ്പ്രേ ചെയ്യുല്പ്പഴുണ്ടാകുന്ന ബാഷ്പം ശ്വസിക്കാതിരിക്കുക
4. സ്പ്രേ ചെയ്തതിനുശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീര ഭാഗങ്ങളും നല്ലവണ്ണം കഴുകുക.
5. സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ പുകവലിക്കുകയോ, പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുകയോ ചവക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
6. കലർത്തുമ്പോഴും സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോഴും പൂർണ്ണ സുരക്ഷക്കായി വേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ :
ചൊറിച്ചിൽ, മാന്ദ്യം, പേശി നടുക്കം, ഞരമ്പുകോച്ചൽ എന്നിവ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാമം.

പ്രഥമ ചികിത്സാ നടപടികൾ :
1. വിഷം അകത്ത് കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, രോഗി അബോധാവസ്ഥയിലല്ലെങ്കിൽ ഛർദ്ദിപ്പിക്കുക. ഒരു ടേബ്ൾസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി രോഗിയെ കുടിപ്പിക്കുകയും തൊണ്ടയിൽ വിരൽ കടത്തി ഛർദ്ദിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
2. ചർമ്മ മലിനീകരണം : പുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചുമാറ്റുകയും വിഷം ബാധിച്ച ശരീരഭാഗം ധാരാളം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.
3. കണ്ണിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ : 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റു നേരം ഉപ്പുവെള്ളമോ/ശുദ്ധജലമോ ഉപയോഗിച്ച് പുറത്ത് കളയുക.
4. ശ്വസിക്കാനിടയായാൽ : രോഗിയെ ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ഉടനെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഫൈറ്റോടോക്സിസിറ്റി :
ഈ ഉൽപ്പന്നം ശുപാർശപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽഫൈറ്റോടോകിസിറ്റി ഇല്ലാത്താണ്.

മറു മരുന്ന് :
അറിയപ്പെട്ട മറുമരുന്നുകളൊന്നുമില്ല, ലക്ഷണങ്ങൾക്കൊത്ത്ചികിത്സിക്കുക.

ഒഴിഞ്ഞ ടിന്നുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് :
1. ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകളോ, ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന സാമഗ്രികളോ, കീടനാശിനി കലർന്ന കഴുകിയ വെള്ളമോ പരിസരമലിനീകരണവും ജലമലിനീകരണവും സംഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി കളയേണ്ടതാണ്.
2. ഒഴിഞ്ഞ ടിന്നുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടയുവാനായി അവ പുറത്ത് ഇടരുത്.
3. പാക്കേജുകൾ പൊട്ടിച്ച് ജനവാസമില്ലാത്ത ഇടത്ത് കുഴിച്ചുമൂടുക.

ശേഖരിച്ചു വെയ്ക്കേണ്ടുന്നവിധം :
1. കീടനാശിനികളടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾപ്രത്യേകം മുറികളിലോ കെട്ടിടങ്ങളിലൊ, മറ്റു സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിക്കുവാനുപയോഗിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറികളിൽനിന്നും വേറിട്ട് സൂക്ഷിക്കേകണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കീടനീശിനിയുടെ അളവും സ്വഭാവവും അനുസരച്ച് പ്രത്യേകം അലമാരികളിൽ വച്ച് താഴിട്ട് പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
2. ബാഷ്പവുമായി കലർന്ന് വായുവിൽ വിഷാംശം കലരുന്നതൊഴിവാക്കാൻ കീടനാശിനി സൂക്ഷിക്കുവാനുപയോഗിക്കുന്ന മുറികളോ കെട്ടിടങ്ങളൊ പ്രകാശമുള്ളതും, സുനിർമ്മിതവും, വരണ്ട്, കുളുർമയോടുകൂടി, ആവശ്യമുള്ള ജാലകങ്ങളോടികൂടിയതായിരിക്കണം.ച

ഒപ്റ്റിമൽ റീ-എൻട്രി കാലയളവ്: 48 മണിക്കൂർ.

മുന്നറിയിപ്പ്: ഈ ലേബൽ/ ലഘുലേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയതൊഴികെ ബാക്കി വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 5% ಎಸ್‌ಸಿ
ಟಿಝೆಡ್™
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಟಿಝೆಡ್ 5% ಎಸ್‌ಸಿಯು ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್, ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್, ಭತ್ತದ ಎಲೆ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಭತ್ತದ ಎಲೆ ಮಡಚುವ ಹುಳ (ರೈಸ್ ಗಾಲ್ ಮಿಡ್ಜ್), ವೈಟ್ ಬೇಕ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಮಾಡುವ ಹುಳ ಮತ್ತು ಕೋಸು ಬೆಳೆಯ ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೋತ್, ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಆ್ಯಪಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಯ ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಬುಡ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ ಎ.ಐ. (ಕನಿಷ್ಠ ಶುದ್ಧತೆ 90%)	5.000% W/W
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ	5.000% W/W
ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್)	8.000% W/W
ಸ್ಟಿಕಿಂಗ್/ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಲೈಜಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿ ಮಿಥೈಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್)	4.000% W/W
ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಡೈನಾಫಿಥೈಲ್ ಮೀಥೆನಾಲ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್)	3.000% W/W
ಸಮ ಪರಿಮಾಣದ ಮಿಶ್ರಣ (ಮುಖ್ಯ ಮಿಶ್ರಣಗಳಾದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫೆನಾಯಿಲ್ ಎಥೋಕ್ಸಿಲೇಟ್,ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಎಥೋಕ್ಸಿಲೇಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆಂಝೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್)	8.000% W/W
ನೀರು	ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಲು QS 100
ಒಟ್ಟು	100.000% W/W

ಶಿಫಾರಸುಗಳು :

ಬೆಳೆ	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಅಳತೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ			ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವಿನ ನಡುವೆ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯ ಅವಧಿ
		ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ/%)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿಲಿ. ಲೀ.)	ನೀರಿನ ಅಳತ (ಲೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)	
ಭತ್ತ	ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್, ಭತ್ತದ ಎಲೆ ಮಡಿಚುವ ಹುಳ, ಭತ್ತದ ಗಾಲ್ ಮಿಡ್ಜ್, ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್ ವೋರ್ಲ್ ಮ್ಯಾಗೊಟ್	50-75	1000-1500	500	32 ದಿನಗಳು
ಕೋಸು	ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೋಥ್	40-50	800-1000	500	7 ದಿನಗಳು
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಆ್ಯಪಿಡ್ ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ	40-50	800-1000	500	7 ದಿನಗಳು ದಿನಗಳು
ಕಬ್ಬು	ಬುಡ ಹಾಗೂ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವಹುಳ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕಡಿಯುವ ಹುಳ	75-100	1500-2000	500	9 ತಿಂಗಳುಗಳು

ಫಸಲನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪರಿಕರ :
ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಾಣದ ನಾಝುಲ್‌ಅನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್, ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೂಟ್ ಪಂಪ್, ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕರ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಿಂದ ಚಲಿಸಲ್ಪಡುವ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು :
1. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ, ಖಾಲಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಿಡುವ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿಡಿ.
2. ಬಾಯಿಗೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
3. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಇಬ್ಬನಿ (ಮಂಜು)ಯೊಳಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
4. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಲಿನವಾದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
5. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಲೀ, ಏನನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿಯುವುದಾಗಲೀ, ತಿನ್ನುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅಗಿಯುವುದಾಗಲೀ ಮಾಡಬೇಡಿ.
6. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಉಡುಪುಗಳನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ .

ವಿಷ ತಗುಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು :
ಮುಂಗೋಪ, ಆಲಸ್ಯ (ಜಡತ್ವ), ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ, ಕ್ಷೋಭೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಳತೆಗಳು:
1. ಒಂದುಪಕ್ಷ ಒಳಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯು ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ರೋಗಿಯ ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಕಚಗುಳಿಯಿಡಿ.
2. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ : ಮಲಿನವಲ್ಲದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿತ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
3. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೋಂಕಿದ್ದಲ್ಲಿ : ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಲೈನ್ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ವಾದ ನೀರನ್ನು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಮುಕಿಸಿ.
4. ಒಳಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ : ರೋಗಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ.

ವಿಪರೀತ ವಿಷಕಾರತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ :
ಜಾಗದ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಪರೀತ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವಿಷ :
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿವಿಷದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವಿಕೆ :
1. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಳಿದುಳಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ಕಂಟೇನರ್ (ಡಬ್ಬ)ಗಳನ್ನು ಜನವಸತಿಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಿ.
2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹುಗಿಯಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು :
1. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನಿಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಿಡುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು.
2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಆವರಣವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಣಗಿದ್ದು ತಂಪಾಗಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು ಕಲುಷಿತ ಭಾಷ್ಪವು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತಿರಬೇಕು.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ: 48 ಗಂಟೆಗಳು

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Read Instructions Leaflet before use

Store in a cool, dry and well ventilated place

Fipronil 5% SC

TZED™

Manufactured by

KR LIFESCIENCES PVT. LTD.

29, LALA LAJPAT RAI SARANI (ELGIN ROAD) KOLKATA - 700 020 INDIA

E-mail : kr@krishirasayan.com
Website : www.krishirasayan.com

For manufacturing unit address see first three characters of batch no. and see below :

KRR :
Maitapur, P.O. Ranital
Balasore, Orissa, PIN - 756 111
Mfg. Lic. No. e-Lic/INSECTI/MAN-PP-2

KRK :
Joykrishnapur, P.O. Bonhoogly II
Sonarpur, South 24 Parganas,
West Bengal, PIN - 700 103
Mfg. Lic. No. MPP/ILC/145/K-2

Customer Care Detail :
KR LIFESCIENCES PVT. LTD.
29, Lala Lajpat Rai Sarani, Kolkata - 700 020
Toll Free No. : 18001211800
email : customercare@krishirasayan.com

Not to be used on crops other than specified on this leaflet

DANGEROUS TO RE-USE EMPTY CONTAINERS/PACKAGES